


06/03/2026

Klinische farmacie op spoed

Apr. Julie Van Den Broucke



Inhoudstafel

Inleiding

Actualisatie en optimalisatie medicatieschema
patiënt

Patiënteducatie risicopatiënten en -geneesmiddelen

Take home messages

Inhoudstafel

Inleiding

Actualisatie en optimalisatie medicatieschema
patiënt

Patiënteducatie risicopatiënten en -geneesmiddelen

Take home messages

Inhoudstafel

Inleiding

Actualisatie en optimalisatie medicatieschema
patiënt

Patiënteducatie risicopatiënten en -geneesmiddelen

Take home messages

Inhoudstafel

Inleiding

Actualisatie en optimalisatie medicatieschema
patiënt

Patiënteducatie risicopatiënten en -geneesmiddelen

Take home messages

Inhoudstafel

Inleiding

Actualisatie en optimalisatie medicatieschema
patiënt

Patiënteducatie risicopatiënten en -geneesmiddelen

Take home messages

Klinische farmacie op spoed

- Apotheker en apotheekassistent
- Meedenken over het juiste en veilige geneesmiddelengebruik voor patiënten
- Taak in het voorkomen van medicatiefouten
- Patiënteducatie voorzien

Hoogrisicoprocessen

- **Urgente opnames (spoed)**
- Chirurgie (preop-perop-postop)

Hoogrisicopatiënten

- >75 jaar
- Polypathologie/polyfarmacie
- Chronisch nierinsufficiëntie
- Hartfalen

Hoogrisicogeneesmiddelen

- Bloedverdunners
- Pijnstillers: NSAID/opiaten/...
- Antidiabetica
- Antibiotica
- Psychoformaca
- ...

Hoogrisicoprocessen

- **Urgente opnames (spoed)**

Feiten en cijfers

Medicatieverificatie

- Probleem: veel discrepanties in medicatieschema's bij opname
 - 60–67% van de patiënten minstens één medicatie-discrepantie heeft bij opname/ontslag
 - gemiddeld 1–3 fouten per patiënt
 - tot 27% van de discrepanties klinisch relevant
- Barrières
 - Tijdsdruk
 - onbetrouwbare informatiebronnen
 - te zieke patiënten
 - moeilijk bereikbare zorgverleners
 - taalproblemen



Anamnese: kleine vraag, groot verschil

Checklist farmaceutische anamnese stappen 1-2-3

A Patiëntidentificatie (naam - voornaam - geboortedatum) Armband-Bevraag-Check A B C

B Bronnen: lijst huisarts / rusthuis / patiënt / laatste ontslagbrief / Vitalink / eH.Box / Sumehr / mijn WGK

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 "Zorgt u zelf voor uw medicatie?" | ja ☐ nee ☐ | Wie? Bellen huisarts/apotheker/thuisverpleegkundige? |
| 2 "Heeft u uw medicatie bij?" | ja ☐ nee ☐ | Doosjes nakijken? Inname halve/volledige/... comprimé? |
| 3 "Heeft u een lijstje bij?" | ja ☐ nee ☐ | overlopen met patiënt? (zie ingesande documenten in KW) |

C Bevraging

1 "Zijn er geneesmiddelen die u niet verdraagt?"

Allergie of andere ernstige nevenwerking op geneesmiddelen?
Welke reactie en wanneer?

2 "Welke medicatie neemt u?"

Bevraging medicatie + extra aandachtspunten:

Bloedverduunners / antistolling? Asaflo®, Clopidogrel®, Ticagrelor®, Marcoumar®, Marevan®, Sintrom®, Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa®, Xarelto®...	Suiker? Cholesterol?
Pijnstillers? Ontstekingsremmers, Tramadol, ...	Hormonale geneesmiddelen? Bv. Cortisone, de pil, ...
Geneesmiddelen tegen maagklachten? Pantoprazole, Omeprazole, ...	Oogdruppels? Neusdruppels?
Inspuiting? Clexane®, Fraxiparine®, Insuline?	Puffers? Indien puffers, Medrol? Hoestsiroop?
Bisfosfonaten? (Pola®, Aclasta®) Dagelijks / wekelijks / maandelijks / jaarlijks	Pleisters? Durogesic®, Transtec®, Trinipatch®
Indien Ledertrexaat, foliumzuur?	Slaapmiddelen?
Vitamines/planten/kruident/homeopathische middelen? Kruidenwinkel? St-Janskruid, Ginkgo Biloba?	Zalven, cremes, gels?
Calcium, magnesium, andere voedingssupplementen?	Magistrale bereiding?
Geneesmiddelen 1x/week 1x/maand - 1x/jaar? Zo nodig?	

3 "Is er recent iets aan uw medicatie gewijzigd?"

! Werd recent antibiotica gebruikt? Zijn er geneesmiddelen toegevoegd, wijziging dosis, gestopt...?
Neemt u al uw medicatie in? Peil naar **therapietrouw** van de patiënt!
! Herhaal en vat samen. "Hoeveel geneesmiddelen neemt u 's morgens, 's middags, 's avonds?"
! Laatste inname/toediening? Bloedverduunners, opioïde pleisters...?

3 "Is er recent iets aan uw medicatie gewijzigd?"

! Werd recent antibiotica gebruikt? Zijn er geneesmiddelen toegevoegd, wijziging dosis, gestopt...?
Neemt u al uw medicatie in? Peil naar **therapietrouw** van de patiënt!
! Herhaal en vat samen. "Hoeveel geneesmiddelen neemt u 's morgens, 's middags, 's avonds?"
! Laatste inname/toediening? Bloedverduunners, opioïde pleisters...?

D Registreer / actualiseer het medicatieschema in KWS in de thuistherapiemodule
E bevestig de therapie m.b.v. de knop 'nagelijken' (verpleegkundige) of 'valideer' (artsen)



HARM

HOSPITAL ADMISSION
RELATED TO MEDICATION



HARM

- = **Hospital Admission Related to Medication**
- Een **HARM** is een ziekenhuisopname die (mogelijk) veroorzaakt werd door medicatiegebruik of waarbij medicatie een bijdragende factor kan zijn.
- Oorzaken:
 - Ondergebruik
 - Overgebruik
 - Verkeerd gebruik
 - Bijwerkingen
 - Interacties
- Voorbeelden:
 - bloeding door anticoagulantia vs. wonde die onhoudbaar bloed bij patiënt die een bloedverdunner neemt
 - hypoglycemie bij diabetesmedicatie
 - verwardheid door opioïden

→ 5–15% van alle ziekenhuisopnames is medicatiegerelateerd

Feiten en cijfers

Medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames

- 5–15% van alle ziekenhuisopnames is medicatiegerelateerd

Oorzaken en betrokken geneesmiddelen

- Meeste opnames door ADR's en ADE's
- 50–66% is vermijdbaar
- Vaak betrokken geneesmiddelklassen:

Antitrombotica

Cardiovasculaire
middelen

Psychofarmaca en
anti-epileptica

Niet-opioïde
analgetica

Feiten en cijfers

Risicofactoren



Hogere leeftijd



Polyfarmacie



Comorbiditeit



Cognitieve
beperkingen



Non-
adherentie

Feiten en cijfers

Kernboodschappen

- Medicatiegerelateerde opnames zijn frequent én vaak vermijdbaar
- Belangrijke interventies:
 - Medicatie actualiseren en analyseren
 - Risicofactoren identificeren
 - Patiënteneducatie en belang van therapietrouw
 - Monitoring van hoogrisico geneesmiddelen
- Actieve betrokkenheid van apotheekassistenten en apothekers
- Noodzaak van goede documentatie en transmurale communicatie om veiligheid te verbeteren en heropnames te voorkomen

Op spoed is apotheek aanwezig voor **HARM** detectie

Hospital Admission Related to Medicatie



HARM detectie

UNDER-prescribing

Onbehandelde indicatie

Duurtijd te kort

OVER-prescribing

Dubbele therapie

Geen geldige indicatie

Duurtijd te lang

MIS-prescribing

Contra-indicatie

Onaangepaste dosis i.f.v. leeftijd, nierfunctie, gewicht

Nevenwerkingen

Farmacologische interacties

Foutieve toedieningsmodaliteiten

TRIGGER TOOL FOR SCREENING FOR DRUG-RELATED HOSPITAL ADMISSIONS IN OLDER PERSONS

Trigger on admission
or up to 48 hours of
admission

Suspected causative drugs or causes for underuse

Diagnoses

Fall and/or fracture
and/or orthostatic
hypotension

Use of any of the following drugs?

- ☐ Benzodiazepines
- ☐ Non-benzodiazepine hypnotics e.g. zopiclone, zolpidem
- ☐ Antipsychotics
- ☐ Antidepressants

- ☐ Sedating antihistamines
- ☐ Opioids
- ☐ Anticholinergics
- ☐ Other (Please specify):

Use of any drugs that cause orthostatic hypotension?

- ☐ Direct renin inhibitors (e.g. aliskiren)
- ☐ Anti-Parkinson drugs
- ☐ Antidepressants (mainly tricyclic)
- ☐ Antipsychotics
- ☐ Calcium channel blockers
- ☐ Diuretics
- ☐ β blockers

- ☐ ACE inhibitors
- ☐ Angiotensin receptor blockers
- ☐ Nitrates
- ☐ Gliflozines (SGLT2-inhibitors)
- ☐ α 1-receptor blockers
- ☐ Other (Please specify):

If a fall is caused by hypoglycaemia, look for use of drugs that contribute to hypoglycaemia

Underuse of any of the following drugs in patients with known osteoporosis and/or history of fragility fracture(s) and/or Bone Mineral Density T-scores of -2.5 or lower in multiple sites?

- ☐ 800 IU Vitamin D/d (+ 1000-1200 mg calcium/day if dietary intake is <1200-1000mg/day)
- ☐ Bone anti-resorptive therapy (e.g. bisphosphonates, strontium, ranelate, teriparatide, or denosumab)

Underuse of any of the following drugs in patients on corticosteroid therapy ≥ 3 months?

- ☐ 800 IU Vitamin D/d (+ 1000-1200 mg calcium/day if dietary intake is <1200-1000mg/day)
- ☐ Bisphosphonates

Underuse of vitamin D in patients who are housebound and/or have experienced falls or with osteopenia with Bone Mineral Density T-score between -1 and -2.5 in multiple sites?

Inhoudstafel



Actualisatie en optimalisatie medicatieschema
patiënt



Optimalisatie medicatieschema

- Juiste innamemoment van medicatie
- Correct gebruik van medicatie/therapie(on)trouw
- Indicaties

Patiënteducatie

- specifieke patiëntenpopulaties

Op Juiste Tijd En Stond Uw Geneesmiddel In De Mond



ALGEMENE REGEL: NEEM UW GENEESMIDDELEN STEEDS IN BIJ DE MAALTIJD, UITGEZONDERD:

Inname buiten de maaltijd:

INNAME BUITEN DE MAALTIJD? = gescheiden van voedselinname = 1 uur vóór of 2 uur na eten

WAAROM? Voedingsmiddelen kunnen een invloed hebben op de **absorptiegraad** van geneesmiddelen door bijvoorbeeld **complexatie van het geneesmiddel**, **veranderen van de pH in de maag**, **adsorptie van het geneesmiddel**,...

1.	Cardiovasculair stelsel	
	Cellprolol: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Selectol
	Propranolol (directe vrijgave): bij voorkeur innemen vóór de maaltijd	Inderal
2.	Gastro-intestinaal stelsel	
	Antacida: 1 à 2 uur na de maaltijden	Gaviscon, Riopan, Syngel
	Gastropromotica: 20 min. vóór de maaltijd	Litcan, Motilium
	Protonpompinhibitoren: 20-30 min. vóór de maaltijd	Dakar, Losec, Nexiam, Omeprazole, Pantomed, Pariet
3.	Hormonaal stelsel	
	Schildklierhormonen: 30 min. vóór ontbijt en niet samen met andere geneesmiddelen	L-thyroxine
4.	Anti-tumorale middelen	
	Purine-analogen: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Puri-Nethol
	Pyrimidine analogen: 30 min. na de maaltijd	Xeloda
	Alkylerende middelen: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Alkeran, Leukeran, Temodal
	Tyrosinekinase inhibitoren: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Nexavar (buiten vetrijke maaltijd, bij voorkeur bij zeer mager voedsel), Tarceva, Tasigna, Tyverb, Votrient
5.	Mineralen	
	Ijzerpreparaten: een half uur vóór of 2 uur na de maaltijd. De opname wordt verbeterd door inname met fruitsap. Mond spoelen na inname om geelverkleuring van de tanden te voorkomen.	Ferricure, Losferron
	Magnesium: na de maaltijd innemen + interval van 2 uur respecteren indien samen met andere geneesmiddelen	Magnetop
6.	Diverse geneesmiddelen	
	Bellozal: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	
	Bisfosfonaten: 30 min. vóór ontbijt in rechtopzittende houding, met een groot glas water. Niet neerliggen tot 30 min. na inname. Koffie en fruitsap vertragen de opname.	Actonel, Alendronaat, Fosavance
	Mestilon: 1 uur vóór de maaltijd	
	Natriumbicarbonaat: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Natriumbicarbonaat
	Levodopa: 30 min. voor de maaltijd of ten minste 1 uur na de maaltijd + gebruik <u>geen</u> melkproducten bij de inname	Prolopa, Stalevo
	Zytiga: minstens 2 uur na de maaltijd + na inname minstens 1 uur niet eten	

Anti-infectieuze Middelen

Algemene regel: mogen steeds bij de maaltijd ingenomen worden

Uitzonderingen: moeten **buiten de maaltijd** worden ingenomen:

Chinolonen: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd, ijzer, magnesium, aluminium, strontium en calcium (= melk, yoghurt,...)	Avelox, Ciproxine, Tavanic
Penicillines: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Floxapen, Staphycid, Peni-Oral
Fosfomycine: Dit geneesmiddel op een lege maag innemen (2-3 uur vóór of 2-3 uur na de maaltijd), bij voorkeur voor het slapengaan en na het legen van de blaas	Monuril
Tuberculostaticum rifampicine: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	Rifadine
Tetracyclines: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd, ijzer, magnesium, aluminium, strontium en calcium (= melk, yoghurt,...) Rechtopzittend innemen met een groot glas water en tot 30 min. na inname niet gaan liggen.	Minotab, Tetralysal, Vibratab
Anti-Schimmel Middelen: - Nystatine susp.: buiten de maaltijden nemen - Sporanox SIROOP: buiten de maaltijden innemen (☐ sporanox CAPSULES tijdens de maaltijd) + niet in combinatie met geneesmiddelen die het maagzuur neutraliseren - Vfend: 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd	

Antidiabetica:

Tijdens de maaltijd:

- Glucophage, Metformax
- Glucovance, Eucreas, Janumet
- Specifiek bij ontbijt: Uni Diamicron
- Actos
- Galvus, Januvia, Onglyza

Binnen de 30 min. vóór de maaltijd:

- Daonil
- Amarylle, Glibenese, Gliclazide 80 mg, Glurenorm
- Novonorm: vlak voor de maaltijd!

→ Snelteksten

Geneesmiddel(groep)	Toedieningstijdstip en of toedieningsmodaliteit	Formulariumproducten
Farmaco-therapeutische groep: Bloed en stolling		
Bloedverdunners	Bloedverdunner	Asaflow, Clopidogrel EG, Efient, Brilique, Sintrom, Marcoumar, Marevan, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Rivaroxaban Sandoz, Lixiana
Farmaco-therapeutische groep: Gastro-intestinaal stelsel		
Antacida	1 tot 2 uur na de maaltijd	Gaviscon, Riopan
Gastroprokinetica	20 minuten voor de maaltijd	Litican, Domperidone Instant EG, Itoprom, Primperan
Loperamide	Start met 2 ineens, daarna 1 na elke losse stoelgang, max. 8 per dag	Imodium Instant
Montelukast	's Avonds innemen	Montelukast EG
Protonpompinhibitoren	20-30 minuten voor de maaltijd	Pantoprazole EG, Omeprazole EG, Nexiam, Losec, Lansoprazole EG
Farmaco-therapeutische groep: Ademhalingsstelsel		
Inhalatiecorticosteroïden	Na puffen mond spoelen en water uitspuwen om heesheid en schimmelvorming te voorkomen	Novolizer, Flixotide, Bufomix, Inuvair, Relvar, Seretide, Symbicort, Trelegly, Trimbrow, Trixeo
Farmaco-therapeutische groep: Hormonaal stelsel		
Gliniden	Vlak voor de maaltijd innemen	Novonorm
Hypoglykemiërende sulfamiden	30 minuten voor de maaltijd	Glimepride EG, Glurenorm, Uni-Diamicron
Semaglutide	30 minuten voor de maaltijd op een lege maag	Rybelsus
Thyroidhormonen	30 minuten voor het ontbijt, niet met andere medicatie (behalve PPI's zoals pantoprazol, omeprazol). Inname minstens 3 uur voor antacida	L-Thyroxine
Farmaco-therapeutische groep: Urogenitaal stelsel		
Tamsulosine	30 minuten na de maaltijd, capsule in zijn geheel inslikken, in staande of zittende houding (niet neerliggen)	Tamsulosine EG
Farmaco-therapeutische groep: Pijn en koorts		
Combinatiepreparaat paracetamol en tramadol	Sterke pijnstillers, combinatie van paracetamol en tramadol. Innemen bij onvoldoende pijnstilling met paracetamol. Maximale dagdosis van 4 g paracetamol niet overschrijden en minimaal 4-6 uur tussen twee innames aanhouden.	Zaldiar
Paracetamol	1e keuze pijnstiller, steeds als laatste afbouwen volgens pijn	Dafalgan
Tramadol	Sterke pijnstilling, in te nemen bij onvoldoende pijnstilling met paracetamol	Tradonal
Farmaco-therapeutische groep: Osteo-articulaire aandoeningen		
Bisfosfonaten	30 minuten voor ontbijt rechtopzittend innemen met een groot glas water. Niet liggen tot 30 minuten na inname	Alendronate EG, Pamidronate EG, Risedronaat Sandoz, Zoledronate EG

→ Snelteksten

Ontstekingsremmers	Ontstekingsremmer, in te nemen bij onvoldoende pijnstilling met paracetamol, tijdens de maaltijd	Ibuprofen EG, Naproxene EG
Farmaco-therapeutische groep: Zenuwstelsel		
Antiparkinsonmiddelen	30 min. vóór of minstens 1 uur na de maaltijd innemen. Vermijd melkproducten. Enkel bij maag/darmklachten tijdens de maaltijd innemen	Prolopa, Duodopa, Stalevo, Corbitta
Pyridostigmine	1 uur voor de maaltijd om kauw- en slikstoornissen te voorkomen	Mestinon
Farmaco-therapeutische groep: Infecties		
Cefuroxim	Tijdens of vlak na de maaltijd	Zinnat
Chinolonen	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, ijzer, magnesium, aluminium, strontium, calcium (bv. melk, yoghurt)	Moxifloxacin Teva, Tavanic, Ciproxine
Erythromycine	30 minuten voor de maaltijd	Erythrocin
Flucloxacilline	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd.	Floxapen, Staphycid
Fosfomycine	Op een lege maag innemen (2-3 uur voor of na de maaltijd), bij voorkeur vóór slapengaan na blaaslediging	Monuril
Itraconazole capsules	Tijdens de maaltijd	Sporanox harde caps.
Nitrofurantoïne	30 minuten voor de maaltijd	Furadantine
Nystatine suspensie	Buiten de maaltijd	Nilstat
Rifampicine	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd	Rifadine
Tetracyclines	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd, ijzer, magnesium, aluminium, strontium, calcium (bv. melk, yoghurt). Rechtopzittend innemen met veel water, niet liggen tot 30 min na inname. Vermijd felle zon en zonnebank.	Doxycycline EG, Tetralysal, Mino-50
Voriconazole	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd	Vfend
Farmaco-therapeutische groep: Immuniteit		
Bilastine	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd	Bellozal
Farmaco-therapeutische groep: Mineralen en vitaminen		
Magnesium	Buiten de maaltijd en niet samen met andere geneesmiddelen	Magnetop
Ijzerpreparaten	Een half uur voor of 2 uur na de maaltijd. Mond spoelen na inname om tandverkleuring te voorkomen.	Losferron, Tardyferon
Farmaco-therapeutische groep: Overige		
Natriumbicarbonaat	1 uur voor of 2 uur na de maaltijd	Natriumbicarbonaat 1g
Befact forte	Gebruik langer dan een maand wordt afgeraden! => indien (langdurige) aanvulling vitaminedeficiënties gewenst: voorstel alternatief: BeforteX 1x/dag --> te bespreken met (huis)arts aub	

Casus optimalisatie medicatieschema patiënt

- geef enkele voorbeelden:

Medicatie	Toed.	Dosis	schema	...	Opm.
> PANTOMED	☺ PO	40 mg • 1 keer per dag		± 11	20 tot 30 min voor de maaltijd
> MOTILIUM	☺ PO	10 mg # bij misselijkheid, max 3 x per dag		17 10	
✓ MOVICOL					
MOVICOL (ZAKJE 13,8 G)	☺ PO	2 zakje • 1 keer per dag		...	
> INSULINE ACTRAPID	✍ SC	4 E #Bloedglucose 300-350mg/dl:4E, max 1 x per dag		10 10	
> INSULINE LANTUS	✍ SC	16 E • 1 keer per dag			04 bron 14/11/23: medicatieschema WZC
> GALVUS	☺ PO	50 mg • 2 keer per dag		23	
> D-CURE	☺ PO	25000 E • 1 keer per maand			
✓ D-VITAL					
D-VITAL (KAUWTB FRT SINAAS 1000MG/880IE)	☺ PO	1 tabl • 1 keer per dag		21	
> CLOPIDOGREL VIATRIS	☺ PO	75 mg • 1 keer per dag		16	
> VITAMINE B12	✍ IM	1 mg • 1 keer per maand			20 Op de 20ste van de maand
> ARANESP	✍ SC	40 mcg • 1 keer per twee weken		04	
> NATR.BICARBONAAT	☺ PO	1 g • 1 keer per dag			
> CEDOCARD	SUBL	5 mg # bij thoracale pijn, max 3 x per dag		17 04	
> BURINEX	☺ PO	2.5 mg • 1 keer per dag		25	
> NOBITEN	☺ PO	5 mg • 1 keer per dag			
✓ TAMSULOSINE EG					
		0.4 mg • 1 keer per dag			Ongeveer 30 minuten na de maaltijd innemen. De capsule in zijn geheel inslikken, in staande of zittende houding (niet neerliggen).
TAMSULOSINE EG (CAPSULETAP 0.4 MG)	☺ PO				

Casus optimalisatie medicatieschema patiënt

- Antwoord:

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend			Middag	Namiddag	Avond		Opmerkingen
			07:30u	08u	10u	12u	16u	18u	20u	
PANTOMED TABL 40 MG (Stofnaam: pantoprazol)	via de mond	dagelijks	1 tabl							20 tot 30 min voor de maaltijd
MOVICOL ZAKJE 13,8 G	via de mond	dagelijks		2 zakje						
GALVUS TABL 50MG (Stofnaam: vildagliptine)	via de mond	dagelijks		1 tabl				1 tabl		
D-CURE CAPS 25 000 IE (Stofnaam: colecalciferol)	via de mond	1 keer per maand		1 caps						LAATSTE VD MAAND
D-VITAL KALWTB FRT SINAAS 1000MG/880IE (Stofnaam: calcium + colecalciferol)	via de mond	dagelijks						1 tabl		
CLOPIDOGREL VIATRIS TABL 75 MG (Stofnaam: clopidogrel)	via de mond	dagelijks		1 tabl						INDICATIE: bloedverdunner (02/2018 ischemisch CVA)
NATR.BICARBONAAT TABL 1 G	via de mond	dagelijks			1 tabl					1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen
BURINEX TABL 5 MG (Stofnaam: bumetanide)	via de mond	dagelijks		0.5 tabl						
NOBITEN TABL 5 MG (Stofnaam: nebivolol)	via de mond	dagelijks		1 tabl						

Casus optimalisatie medicatieschema patiënt

- geef enkele voorbeelden:

> MEDROL	☺ PO	4 mg • 1 keer per dag		→ 14
> OXYNORM	☺ PO	5 mg # bij pijn/dyspnoe, max 3 x per dag		
> DAFALGAN	☺ PO	1 g # bij pijn om de 6 uur, max 3 x per dag		17 07
> STILNOCT	☺ PO	10 mg • 1 keer per dag		16
✓ DUOVENT				
DUOVENT (MONODOSIS AMP INHAL. 4 ML)	Inhal	2 vial • 4 keer per dag # bij kortademigheid, max 1 x per dag		... →
✓ Andere				
DUOVENT (MONODOSIS AMP INHAL. 4 ML) 0.5 ... NATR.CHLORIDE 0,9% (AMP 10 ML MINIPLASC...	Inhal	1 stuk • 4 keer per dag	16 20	± 11
✓ TRIMBOW				
TRIMBOW (FL INH 87-5-9 MCG/DOS 120 DOS)	Inhal	2 inhal • 2 keer per dag		17 met voorzetkamer

Casus optimalisatie medicatieschema patiënt

- Antwoord:

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend			Middag	Namiddag	Avond		Opmerkingen
			07:30u	08u	10u	12u	16u	18u	20u	
TAMSULOSINE EG CAPS RETARD 0,4 MG (Stofnaam: tamsulosine)	via de mond	dagelijks							1 caps	Ongeveer 30 minuten na de maaltijd innemen. De capsule in zijn geheel inslikken, in staande of zittende houding (niet neerliggen).
MEDROL TABL 4 MG (Stofnaam: methylprednisolon)	via de mond	dagelijks		1 tabl						Begindatum: 14-11-2023 Einddatum: 27-11-2023 11:11
STILNOCT TABL 10 MG (Stofnaam: zolpidem)	via de mond	dagelijks							1 tabl	
VITAMINE B12 INJ INF 1 MG/ML (Stofnaam: cyanocobalamine)	in de spier	1 keer per maand		1 amp						Op de 20ste van de maand
INSULINE LANTUS SOLOSTAR PEN (Stofnaam: insuline glargine)	onderhuids	dagelijks						16 E		bron 14/11/23: medicatieschema WZC
ARANESP SPUIT (ANG) 40 MCG (Stofnaam: darbepoëtine alfa)	onderhuids	1 keer per twee weken						1 spuit		laatste keer was 04/11/23
DUOVENT (MONODOSIS AMP INHAL. 4 ML) 0.5 vial (= 2 ml) NATR.CHLORIDE 0,9% (AMP 10 ML MINIPLASCO) tot 4 ml (= 2 ml)	inhalatie	dagelijks		1 stuk		1 stuk	1 stuk		1 stuk	
TRIMBOW FL INH 87-5-9 MCG/DOS 120 DOS (Stofnaam: beclometason + formoterol + glycopyrronium)	inhalatie	dagelijks		2 inhal					2 inha	met voorzetskamer, na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen.

Casus optimalisatie medicatieschema patiënt



- **Antwoord:**

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend			Middag	Namiddag	Avond		Opmerkingen
			07:30u	08u	10u	12u	16u	18u	20u	
CEDOCARD TABL SL/PO 5 MG (Stofnaam: Isosorbid)	onder de tong		# bij thoracale pijn (max aantal: 3 per dag) Dosis per innname: 1 tabl							
MOTILIUM TABL SMELT 10 MG (Stofnaam: domperidon)	via de mond		# bij misselijkheid (max aantal: 3 per dag) Dosis per innname: 1 tabl							
OXYNORM TABL INSTANT 5 MG (Stofnaam: oxycodon)	via de mond		# bij pijn/dyspnoe (max aantal: 3 per dag) Dosis per innname: 1 tabl							INDICATIE: zeer sterke pijnstiller, bij onvoldoende pijnstilling met paracetamol
DAFALGAN TABL FORTE 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 6 uur (max aantal: 3 per dag) Dosis per innname: 1 tabl							INDICATIE: 1e keuze pijnstiller, steeds als laatste afbouwen volgens pijn tot stop.
INSULINE ACTRAPID PENFILL (Stofnaam: insuline)	onderhuids		#Bloedglucose 300-350mg/dl:4E (max aantal: 1 per dag) Dosis per innname: 4 E							

Optimalisatie medicatieschema

- Juiste innamemoment van medicatie
- Correct gebruik van medicatie/therapie(on)trouw
- Indicaties

Patiënteducatie

- Folder deprescribing
- Extra informatie specifieke patiëntenpopulaties
- Therapie(on)trouw

Casus 1: posologie + therapie(on)trouw DOAC

Medicatie	Toed.	Dosis	Uurschema	Tijdspanne	Opm.
METFORMINE SANDOZ (TABL 850 MG)	☺ PO	850 mg • 2 keer per dag	8 20	... → ...	
UNI DIAMICRON (TABL RETARD 60 MG)	☺ PO	30 mg • 1 keer per dag	8	... → ...	30 minuten voor de maaltijd innemen
ELIQUIS (TABL 2,5 MG)	☺ PO	2.5 mg • 1 keer per dag	8	... → ...	bloedverdunner

Directe orale anticoagulantia (DOAC)

Apr. J. Van Den Broucke, Apr. A. Verhaeghe, Apr. J. De Vleeschauwer, Apr. J. Vanderbeke, Apr. K. Verhelle
Gevalideerd door: Dr. G. Meeus, Dr. I. Elegeert, Dr. M. Dumolein, dr. M. Janssen, dr. K. Van Eygen, dr. M. Leys

INLEIDING

Pradaxa® (dabigatran etexilaat), Rivaroxaban sandoz (Xarelto®), Eliquis® (apixaban) en Lixiana® (edoxaban) zijn directe orale anticoagulantia (DOAC) naast de vitamine K antagonisten (VKA). Deze geneesmiddelen kunnen potentieel tot levensbedreigende complicaties leiden. Ze vertonen daarenboven onderling farmacologische verschillen die in deze poster toegelicht worden.

ALGEMEEN

	PRADAXA® 75 mg - 110 mg - 150 mg compr./ zakjes	RIVAROXABAN XARELTO® 2.5 mg -10 mg - 15 mg – 20 mg compr.	ELIQUIS® 2,5 mg – 5 mg compr.	LIXIANA® 30 mg - 60 mg. (15 mg compr.)
Stofnaam	dabigatran etexilaat	rivaroxaban	apixaban	edoxaban
Werking	trombine (IIa)-inhibitor	directe Xa-inhibitor	directe Xa-inhibitor	directe Xa- inhibitor
INDICATIES				
INDICATIE 1: preventie van trombo- embolische events bij patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF) (niet bij mechanische kunstklep of ernstige mitralisklepstenose)	2 x 150 mg/dag Dosisaanpassing (*) 2 x 110 mg/dag indien: ≥ 80 jaar <u>en/of</u> gastritis, oesofagitis, GER <u>en/of</u> gelijktijdig gebruik van verapamil	1 x 20 mg/dag Dosisaanpassing (*) 1 x 15 mg/dag indien: CrCl 15-50 ml/min	2 x 5 mg/dag Dosisaanpassing (*) 2 x 2,5 mg/dag indien: CrCl 15-30 ml/min <u>en/of</u> ≥ 2 risicofactoren: SCr ≥ 1,5 mg/dl ≥ 80 jaar ≤ 60 ka	1 x 60 mg/dag Dosisaanpassing (*) 1 x 30 mg/dag indien: CrCl 15-50 ml/min <u>en/of</u> ≤ 60 kg <u>en/of</u>

Casus 1: posologie + therapie(on)trouw DOAC

Medicatie	Toed.	Dosis	Uurschema	Tijdspanne	Opm.	Laatste wijziging	Indicatie
> METFORMINE MYLAN	☞ PO	850 mg • 2 keer per dag	8 20	09-05-2023 → ...		30-06-2023 • apotheek	diabetes
✓ UNI DIAMICRON							
UNI DIAMICRON (TABL RETARD 60 MG)	☞ PO	30 mg • 1 keer per dag	8	09-05-2023 → ...		30-06-2023 • apotheek	diabetes
> FORXIGA	☞ PO	10 mg • 1 keer per dag	8	09-05-2023 → ...		30-06-2023 • apotheek	diabetes
> ELIQUIS	☞ PO	2.5 mg • 2 keer per dag	8 20	26-06-2023 → ...	Wegens teveel hematomen maar 1 daags genomen.	30-06-2023 • apotheek	= bloedverdunner (n
> AMIODARONE EG	☞ PO	200 mg • 1 keer per dag	8	06-06-2023 → ...		22-05-2023 • supervisor	
✓ SUVEZEN							
SUVEZEN (TABL 40-10 MG)	☞ PO	1 tabl • 1 keer per dag	8	26-06-2023 → ...	Deze week nog maar 1 ingenomen.	30-06-2023 • apotheek	



Casus 1: deelbaarheid/pletbaarheid medicatie

Medicatie	Toed.	Dosis	Uurschema	Tijdspanne	Opm.
METFORMINE SANDOZ (TABL 850 MG)	☺ PO	850 mg • 2 keer per dag	8 20	... → ...	
UNI DIAMICRON (TABL RETARD 60 MG)	☺ PO	30 mg • 1 keer per dag	8	... → ...	30 minuten voor de maaltijd innemen
ELIQUIS (TABL 2,5 MG)	☺ PO	2.5 mg • 1 keer per dag	8	... → ...	bloedverdunner

- → nazicht deelbaarheid/pletbaarheid medicatie
- www.pletmedicatie.be

^ Uni Diamicron 60 mg tabl. regul. afgifte	
gliclazide 60 mg tablet met geregleerde afgifte (or.)	
actief bestanddeel + dosis + vorm	gliclazide 60 mg tablet met geregleerde afgifte (or.)
farmaceutische vorm	Tablet met geregleerde afgifte
toedieningsweg	Oraal gebruik
deelbaar (kwantitatief)	deelbaar in minstens 2 delen
breuklijn	deelbaar in minstens 2 delen
bevat alcohol	Nee
suikervrij	Nee
atc code	A10BB09
sam code	SAM354137-00
vergunninghouder	Servier Benelux
parallel circuit (parallel import)	geen parallel circuit
pletbaarheid	tablet niet pletbaar

az groeninge
kortrijk

- 

FEBRUARI

- ☒ Inleiding
- ☒ 1. Cardiovasculair stelsel
- ☒ 2. Bloed en stolling
- ☒ 3. Gastro-intestinaal stelsel
- ☒ 4. Ademhalingsstelsel
- ☐ 5. Hormonaal stelsel
 - ☐ 5.1. Diabetes
 - ☒ 5.1.1. Insuline
 - ☒ 5.1.2. Metformine
 - ☐ 5.1.3. Hypoglykemiërende sulfamiden
 -  alle verpakkingen weergeven
 -  **Glibenclamide**

 Zoeken op stofnaam, merknaam, ...

Nieuws

Publicaties

Vorming

Contact

Dosering

40 à 320 mg p.d. in 1 à 2 doses; gereguleerde afgifte: 30 à 120 mg p.d. in 1 dosis 's morgens

R PER MERKNAAM

€ PER GROEPSNAAM

 plaatsbepaling

 alles openvouw

R Gliclazide Sandoz (Sandoz)

® Uni Diamicron (Servier) 

gliclazide

tabl. qerequl. afgifte (deelb. kwantit.)

30 x 60 mg

 R_X a $\ominus$

€ 9,48 

  90 x 60 mg

 $R_X \quad a \oplus$

€ 15,02

R Uni Gliclazide EG (EG) 

Casus 2: posologie: bisfosfonaten

**BCFi**
BELGISCH CENTRUM VOOR
FARMACOTHERAPEUTISCHE INFORMATIE

9.5. Osteoporose en ziekte van Paget

9.5.1. Calcium

9.5.2. Bisfosfonaten

alle verpakkingen weergeven

Alendronaat

Ibandronaat

Pamidronaat

Risedronaat

Zoledronaat

Bisfosfonaat + vitamine D

Bisfosfonaat + calcium + vitamine D



Casus 2: posologie: bisfosfonaten

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend 08u	Middag 12u	Avond 18u	Opmerkingen
XARELTO TABL 10 MG (Stofnaam: rivaroxaban)	via de mond	dagelijks	1 tabl			bloedverdunner. Innemen bij de maaltijd
ALENDRONATE EG COMP 70 MG (WEKELIJKS) (Stofnaam: alendroninezuur)	via de mond	dagelijks	1 tabl			
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks	8 E	12 E	6 E	Met aanpassingsschema.

Bijzondere aandachtspunten:

- Lage biologische beschikbaarheid: belang correcte inname!
- Risico op slokdarmletsels!
- Opgelet voor ongewone doseringsschemata (bv wekelijks, maandelijks, jaarlijks)

ALENDRONATE EG COMP 70 MG (WEKELIJKS) (Stofnaam: alendroninezuur)	via de mond	1 keer per week	1 tabl	30min voor het ontbijt in rechtopzittende houding met een groot glas water en tot 30min na inname niet gaan liggen. steeds in combinatie met calcium/vitamine D. Navraag huisarts/huisapotheker aub. INDICATIE: osteoporose
--	-------------	--------------------	--------	---

Casus 3: posologie: opioïdpleisters

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond		Opmerkingen
			08u	12u	18u	20u	
XARELTO TABL 10 MG (Stofnaam: rivaroxaban)	via de mond	dagelijks	1 tabl				bloedverdunner. Innemen bij de maaltijd
BICLAR TABL 500 MG (Stofnaam: clarithromycine)	via de mond	dagelijks	1 tabl			1 tabl	
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks	8 E	12 E	6 E		Met aanpassingsschema.
DUROGESIC PLEISTER 12 MCG/H (Stofnaam: fentanyl)	op de huid	dagelijks	1 pleister				Begindatum: 04-02-2025
PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 4 per dag) Dosis per inname: 1 tabl				INDICATIE: 1e keuze pijnstiller, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn

DUROGESIC PLEISTER 12 MCG/H (Stofnaam: fentanyl)	op de huid	1 keer om de 3 dagen	1 pleister				Begindatum: 04-02-2025 laatste pleister op 4/2/2025 INDICATIE: sterke pijnstillers, bij onvoldoende pijnstilling met paracetamol, afbouw volgens pijn tot stop.
---	------------	----------------------	------------	--	--	--	---



Casus 3: posologie: opioïdpleisters

→ www.knipmedicatie.be

Merknaam	Actief bestanddeel	Type pleister	Knippen?	Waar aanbrengen?	Toedienings-frequentie	Bevestigingsduur per pleister
Climara®	estradiol	matrix	ja	romp of zitvlak, niet op borsten	1 x per week	continue
Deponit®	nitroglycerine	matrix	ja	linker- of rechterzijde van de borstkas – alternatief binnenzijde van de bovenarm	1 x per dag	continue ofwel gedurende 12 à 16 uur
Diafusor®	nitroglycerine	matrix	ja	borstkas of de buitenkant van de arm of eender welke plaats waar de huid onbeschadigd is	1 x per dag	continue ofwel gedurende 12 à 16 uur
Durogesic®	fentanyl	matrix	ja	borstkas of bovenarm	1 x om 3 dagen	continue
Estalis®	estradiol + norethisteron	matrix	neen	buik, niet op de borsten	1 x om de 3 à 4 dagen	continue
Evra®	ethinylestradiol + norelgestromin	matrix	neen	bil, abdomen, de buitenkant van een bovenarm, de bovenkant van de romp, niet op de borsten	1 x om de week gedurende 3 weken, gevolgd door een onderbreking van 1 week	continue
Exelon®	rivastigmine	matrix	ja	onder- of bovenrug, bovenarm of borst, niet op de dij of buik	1 x per dag	continue
Feminova®	estradiol	matrix	neen	billen, heup of onderbuik, niet op de borsten	1 x per week	continue
Feminova plus®	I estradiol II estradiol + levonorgestrel	matrix	neen	billen, heup of onderbuik, niet op de borsten	1 x per week	continue

Casus: posologie: vitamine D supplementen

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond	Opmerkingen
			08u	12u	18u	
D-CURE DRINKBARE AMP 25.000 E/ML (Stofnaam: colecalfiferol)	via de mond	dagelijks	1 amp			
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks	8 E	12 E	6 E	Met aanpassingsschema.
IBUPROFEN EG TABL 400 MG (Stofnaam: ibuprofen)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 3 per dag) Dosis per inname: 1 tabl			Begindatum: 04-02-2025 Einddatum: 10-02-2025 23:59 = ontstekingsremmer, in kader van hospitalisatie, afbouw volgens pijn tot stop, innemen tijdens de maaltijd.
PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 4 per dag) Dosis per inname: 1 tabl			Begindatum: 04-02-2025 INDICATIE: 1e keuze pijnstiller, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn



Casus: posologie: vitamine D supplementen

Max. **2** GM ↔ GM 0 0 0
GM ↔ Voeding 1

Maximale dosis overschrijdingen. (2)

Ibuprofen PO + rectaal M01AE01

Patient gewicht: lengte: leeftijd: 2j 7m 27d

Per	Formule	Plafond	Grenswaarde	Overschrijding
Gift	Max dosis bij kinderen tot 16j	600 mg	0 mg	400 mg
6uur	Max dosis bij kinderen tot 16j	600 mg	0 mg	400 mg
24uur	Max dosis bij kinderen tot 16j	1800 mg	0 mg	400 mg

Vitamine D A11CC05

Patient gewicht: lengte: leeftijd: 2j 7m 27d

Per	Formule	Plafond	Grenswaarde	Overschrijding
6dagen		50000 E	50000 E	150000 E

Ikv oplaad kunnen tijdelijk hogere dagdosissen noodzakelijk zijn.
Deze maximale dosis is bedoeld als algemene veiligheidsgrens om foutief dagelijkse voorschriften op te pikken.

OK

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond	Opmerkingen
			08u	12u	18u	
D-CURE DRINKBARE AMP 25.000 E/ML (Stofnaam: colecalciferol)	via de mond	1 keer per 4 weken	1 amp			INDICATIE: onderhoudsdosis vitamine D, 1 keer per maand!

Hypervitaminose D

- Vitaminen D preparaten: dosis en posologie steeds goed bevragen!
- https://www.faggafmps.be/nl/news/flash_vig_news_medicatiefout_opgepast_voor_specialiteiten_met_hoge_concentraties_aan_vitamine

Flash Vig-News - Medicatiefout: opgepast voor specialiteiten met hoge concentraties aan vitamine D of vitamine D derivaten

Datum: 17/03/2023

Specialiteiten met een hoge concentratie aan vitamine D of vitamine D derivaten kunnen gemakkelijk een intoxicatie veroorzaken wanneer er fouten in de dosering worden gemaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de doseringsaanbevelingen op te volgen.

Onlangs werd het overlijden van een oudere persoon gemeld in het kader van een medicatiefout. Deze persoon had gedurende twee maanden dagelijks een hoog gedoseerde vitamine D-capsule ingenomen, terwijl een maandelijkse toediening was voorgeschreven. De patiënt werd apathisch. Een bloedonderzoek bevestigde hypercalciëmie en hypervitaminose D. De patiënt is overleden. In dit geval werden er geen mogelijke risico- of versturende factoren (confounding factors) gemeld (behalve de hoge leeftijd van de persoon).

Casus: Ledertrexate®

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond	Opmerkingen
			08u			
D-CURE DRINKBARE AMP 25.000 E/ML (Stofnaam: colecalciferol)	via de mond	1 keer per 4 weken	1 amp			INDICATIE: onderhoudsdosis vitamine D, 1 keer per maand!
LEDERTREXATE TABL 2,5 MG (Stofnaam: methotrexaat)	via de mond	dagelijks	4 tabl			
PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 4 per dag) Dosis per inname: 1 tabl			Begindatum: 04-02-2025 INDICATIE: 1e keuze pijnstillers, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn



Ledertrexate®



→ Ledertrexate: ALTIJD 1 KEER PER WEEK

→ STEEDS in combinatie met foliumzuur (ter reductie toxiciteit!)

LEDERTREXATE TABL 2,5 MG (Stofnaam: methotrexaat)	via de mond	1 keer per week	4 tabl		inname 1 keer per week! Steeds in combinatie met (dagelijks) foliumzuursupplement. Navraag (huis)arts aub! INDICATIE: reumatoïde artritis
--	-------------	--------------------	--------	--	---

ALERT: METHOTREXAAT (LEDERTREXATE®)



Probleemstelling:

1. Methotrexate (MTX) wordt gebruikt in lage dosis in de behandeling van reumatoïde artritis en andere reumatische aandoeningen. Het kent tevens zijn toepassing bij de ziekte van Crohn en bij psoriasis.
2. Daarnaast wordt methotrexate ook gebruikt in hogere dosering als antitumoraal middel.

Aandachtspunt:

In de behandeling van **reumatoïde artritis, ziekte van Crohn en psoriasis** is methotrexate een geneesmiddel dat slechts **1x /week** in lage dosis mag worden ingenomen. Dit in tegenstelling tot het gebruik als antitumoraal middel dat dagelijks wordt gegeven.

Overdosering kan leiden tot zware vergiftigingsreacties met zelfs de dood tot gevolg!

Gebruikelijke dosering:

Starten met een dosis van 10 tot 15 mg (4 tot 6 compr) **1x/week**. Deze dosis kan eventueel verdeeld worden over 3 giften met telkens een interval van 12 uur. De dosis kan worden opgetitreerd tot, indien nodig, 20 tot 30 mg (8 tot 12 compr) **1x/week**.

Belang van foliumzuur inname:

Associatie van foliumzuur leidt tot een duidelijke afname van gastro-intestinale nevenwerkingen en reductie van hepatotoxiciteit ten gevolge van methotrexate inname (= een foliumzuur antagonist).

Ofwel 1 mg foliumzuur per dag

→ Tijdens hospitalisatie kan dit gesubstitueerd worden naar **2 x folavit 0.4 mg per dag**

Ofwel minstens 5 mg foliumzuur éénmaal per week, de dag na de MTX inname.

→ Tijdens hospitalisatie kan dit gesubstitueerd worden naar **2 x folavit 4 mg éénmaal per week, de dag na de MTX inname of gespreid over de week**

Advies

Controle posologie en eenmalige toediening per week + inname foliumzuur.

Ledertrexa

03.11.2025

VIG-news



fagg  .be

Actieve farmacovigilantie

Deze editie van VIG-news biedt een selectie van berichten over farmacovigilantie uit allerlei bronnen, voornamelijk **gepubliceerd tussen 1 januari 2025 en 30 juni 2025**. De meest actuele informatie vindt u in de nieuws-rubriek op de [homepage van de website van het FAGG](#).

Vanaf deze editie zullen nieuwe specialiteiten, nieuwe farmaceutische vormen en nieuwe doseringen niet meer systematisch worden gepresenteerd in de VIG-news. U kunt ze op elk moment raadplegen in de rubriek [Nieuw - Nieuwigheden geneesmiddelen van het BCFI](#).

Oraal methotrexaat voor niet-oncologische indicaties (in België: [Ledertrexate▼](#)): risico op overdosering: een geneesmiddel dat één keer per week moet worden ingenomen, altijd op dezelfde dag.

Voor de behandeling van ontstekingsziekten mag oraal methotrexaat slechts eenmaal per week worden ingenomen, elke week op dezelfde dag. Een overdosering met methotrexaat kan ernstige of zelfs dodelijke gevolgen hebben. Ondanks [de acties die in 2019 op Europees niveau](#)

[ondernomen werden](#) om het risico op medicatiefouten te minimaliseren, worden er in [Frankrijk](#) nog steeds gevallen gemeld. Er wordt aan herinnerd dat er [voorlichtingsmateriaal voor gezondheidszorgbeoefenaars en een kaart voor patiënten beschikbaar](#) zijn om fouten te voorkomen.

Casus: complexvorming


Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend		Middag	Avond	Opmerkingen
			07u	08u	12u	18u	
D-VITAL ZAKJE 500 MG-880E (Stofnaam: calcium + colecalciferol)	via de mond	dagelijks	1 zakje				
L-THYROXINE TABL 100 MCG (Stofnaam: levothyroxine)	via de mond	dagelijks	1 tabl				30min voor ontbijt en niet met andere geneesmiddelen
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks		8 E	12 E	6 E	Met aanpassingsschema.



Max. GM ↔ GM GM x 2 A WM

GM ↔ Voeding Pijnscore ADR

Casus: complexvorming



Ernstige interacties

Drug - drug interactie


L-THYROXINE (TABL 100 MCG) D-VITAL (ZAKJE 500 MG-880E)

(Schildklierhormonen) (Kationen, polyvalente)

Gecontroleerde periode: 28-01-2025 00:00 - 08-01-9999 00:00

Effect: Verminderde werkzaamheid van de schildklierhormonen

Meer info...



Detail interactie

Schildklierhormonen - Kationen, polyvalente (nr. 60000564)

Farmacologisch effect:

- De werkzaamheid van levothyroxine kan dalen bij gezamenlijke inname van ijzer-, calcium-, lanthaan- of aluminiumzouten.
- Tekenen van een hypothyreoïdie kunnen in de loop van de behandeling optreden of aanhouden (vermoeidheid, gewichtstoename, koude-intolerantie en ~~verhoogde TSH waarden~~).

Mechanisme:

- Waarschijnlijk vormen polyvalente kationen moeilijk absorbeerbare complexen met levothyroxine.

Maatregelen:

- De volledige dagdosis levothyroxine moet 's morgens, nuchter en minstens een half uur voor het ontbijt, met (indien mogelijk) leidingwater en zonder te kauwen ingenomen worden.
- Calcium-, ijzer-, lanthaan- of aluminiumzouten mogen ten vroegste 2 uur na levothyroxine ingenomen worden. Soms worden nog grotere tijdsintervallen aanbevolen.
- Antacida worden tussen de maaltijden en vóór het slapengaan ingenomen. Als alternatieven voor de antacida zijn H2-antihistaminica (ranitidine, famotidine) of protonpompinhibitoren (omeprazol, pantoprazol) geschikt, ook als zelfmedicatie.

Commentaar:

- Tot nu toe is de interactie enkel met calcium-, aluminium-, lanthaan- en ijzerionen beschreven. Over andere polyvalente kationen zijn geen gegevens bekend.

Casus: complexvorming

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend			Middag	Avond	Opmerkingen
			07u	08u	10u	12u	18u	
D-VITAL ZAKJE 500 MG-880E (Stofnaam: calcium + colecalciferol)	via de mond	dagelijks		1 zakje				ten vroegste innemen 2 uur na L-thyroxine inname!
L-THYROXINE TABL 100 MCG (Stofnaam: levothyroxine)	via de mond	dagelijks	1 tabl					30min voor ontbijt en niet met andere geneesmiddelen
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks		8 E		12 E	6 E	Met aanpassingsschema.

Casus: complexvorming (2)

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend		Middag	Avond	Opmerkingen
			07u	08u	12u	18u	
LOSFERRON TABL BRUIS 695 MG (80 MG FE) (Stofnaam: ijzer(II))	via de mond	dagelijks		1 tabl			30min voor of 2u na de maaltijd. Steeds de mond spoelen met water na inname om geelverkleuring van de tanden te voorkomen.
ALENDRONATE EG COMP 70 MG (WEKELIJKS) (Stofnaam: alendroninezuur)	via de mond	1 keer per week	1 tabl				30min voor het ontbijt in rechtopzittende houding met een groot glas water en tot 30min na inname niet gaan liggen
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks		8 E	12 E	6 E	Met aanpassingsschema.

Casus: complexvorming (2)

Drug - drug interactie

ALENDRONATE EG (COMP 70 MG (WEKELIJKS)) LOSFERRON (TABL BRUIS 695 MG (80 MG FE))
(Alendroninezuur) (IJzer(II)-D-gluconaat)

Gecontroleerde periode: 28-01-2025 00:00 - 08-01-9999 00:00

Farmacologisch effect beknopt:

Verminderde werkzaamheid van alendroninezuur

Meer info...

Detail interactie

Farmacologisch effect:

- Gelijktijdige inname van polyvalente kationen kan de werkzaamheid van bisfosfonaten verminderen.

Maatregelen:

- Alendroninezuur moet worden ingenomen op een nuchtere maag.
- Antacida en mineraalpreparaten mogen ten vroegste 30 minuten na de inname van alendroninezuur worden gebruikt.
- De aanbevelingen van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

In de tijd gespreide inname:

- Alendroninezuur op een nuchtere maag innemen. Antacida en mineraalpreparaten ten vroegste 30 minuten na de inname van alendroninezuur gebruiken.
- De aanbevelingen van de fabrikant in acht nemen.

Mechanisme:

- De biologische beschikbaarheid van de bisfosfonaten is zeer gering. Bij gelijktijdige inname van polyvalente kationen worden stabiele, moeilijk absorbeerbare complexen gevormd, die de absorptie nog meer in het gedrang kunnen brengen.

Bijwerkingen:

verminderde werking van het geneesmiddel

Literatuur:

Fachinformation Calcium-EAP, Köhler Pharma GmbH (aktueller Stand)
Gertz, B.J. et al, Clin. Pharmacol. Ther. **58**, 288-298 (1995)
Fachinformation Fosamax®, MSD Sharp & Dohme GmbH (aktueller Stand)

Casus: complexvorming (2)

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend			Middag	Avond	Opmerkingen
			07u	08u	10u	12u	18u	
LOSFERRON TABL BRUIS 695 MG (80 MG FE) (Stofnaam: ijzer(II))	via de mond	dagelijks			1 tabl			30min voor of 2u na de maaltijd. Steeds de mond spoelen met water na inname om geelverkleuring van de tanden te voorkomen.
ALENDRONATE EG COMP 70 MG (WEKELIJKS) (Stofnaam: alendroninezuur)	via de mond	1 keer per week	1 tabl					30min voor het ontbijt in rechtopzittende houding met een groot glas water en tot 30min na inname niet gaan liggen

Complexvorming gevoelige medicatie

- Calcium/vitamine D supplementen bv. D-vital[®], Steovit[®]
- Schildklierhormonen bv. L-thyroxine[®]
- Ijzerpreparaten bv. Losferron[®]
- Bisfosfonaten bv. Alendronate
- Fluorochinolones bv. Ciproxine[®], Tavanic[®], Moxifloxacin

Casus : Maximale dosis

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond		Opmerkingen
			08u	12u	18u	20u	
PRAREDUCT TABL 40 MG (Stofnaam: pravastatine)	via de mond	dagelijks	1 tabl			1 tabl	
INSULINE NOVORAPID FLEXPEN (Stofnaam: insuline aspart)	onderhuids	dagelijks	8 E	12 E	6 E		Met aanpassingsschema.
IBUPROFEN EG TABL 400 MG (Stofnaam: ibuprofen)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 3 per dag) Dosis per inname: 1 tabl				Begindatum: 04-02-2025 Einddatum: 10-02-2025 23:59 = ontstekingsremmer, in kader van hospitalisatie, afbouw volgens pijn tot stop, innemen tijdens de maaltijd.
PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 4 per dag) Dosis per inname: 1 tabl				Begindatum: 04-02-2025 INDICATIE: 1e keuze pijnstiller, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn

Casus: Maximale dosis

Datum	Afdeling	Tekst	Contact type	Zender
01-05-2023 09:03	KNCH	advies apotheek ikv hospitalisatie: mevrouw neemt prareduct 80 mg/dag (= pravastatine) --> maximale dagdosis = 40mg/dag! --> zou dat kloppen? Kan dit aub nogmaals nagevraagd worden ikv nevenwerkingsprofiel statines	hospitalisatie	Julie Van Den Broucke

Volwassenen

HYPERCHOLESTEROLEMIE

- Aanbevolen dosering: 10 tot 40 mg, 1 keer per dag.
- Maximale dosis: 40 mg, 1 keer per dag.

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE

- Aanbevolen dosering: 40 mg, 1 keer per dag.

NA TRANSPLANTATIE

- Aanbevolen startdosering: 20 mg, 1 keer per dag, indien in combinatie met immunosuppressieve therapie.
- Maximale dosis: 40 mg, 1 keer per dag (onder strikte medische controle).

Pediatrische patiënten (14-18 jaar)

HETEROZYGOTE FAMILIALE HYPERCHOLESTEROLEMIE

- Aanbevolen dosering: 10 tot 40 mg, 1 keer per dag.

Een dosisaanpassing is aangewezen bij matige of ernstige nierinsufficiëntie en bij leverinsufficiëntie.

Toedieningswijze

- De tabletten 1 keer per dag innemen, bij voorkeur 's avonds, voor, tijdens of na de maaltijd.

Casus: Maximale dosis

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond	Opmerkingen
			08u	12u	18u	
PRAREDUCT TABL 40 MG (Stofnaam: pravastatine)	via de mond	dagelijks			1 tabl	advies apotheek: maximaal 40mg/dag innemen aub. Te bespreken met (huis)arts aub.



TIPS & TRICKS

Voorgeprogrammeerde schema's in KWS

Overzicht Hos Overzicht Hos V2 Insuline Pomp Shockbox Chemo-PTS-KS (Thuis)therapie Ambulant voorschrift Vaccinatie Medicatie balans

Vernieuw Nieuw Schema tEMV tAmb.Vs. Valideer Print Filter op einddatum na: Dat 04-02-2025 Sortering: Patiëntvriendelijke afdruk

Max. 1 GM ↔ GM 0 0 0 GM x 2 0 A 0 WM 0 0 0 GM ↔ Voeding 1 Pijnscore -1 ADR 1

Therapieschema (AZ Groeninge)

Schema: ZB courante thuismedicatielijnen (input spoed/preop) Context: KAPO / * / *

Startdatum: 04-02-2025 10:14

Naar thuis therapie	Naar ambulant voorschrift	Medicatie	Toedie...	Dosis	Frequentie	Uurschema	Conditie	...	Nota	Indicatie
☐	☐	✓ ALGOTRA (TABL 37,5-325 MG)	PO	1 tabl			# bij pijn om de 6 uur (max 6)	...		sterke pijnstiller, combinatiepreparaat van
☐	☐	✓ ASAFLOW (TABL 80 MG)	PO	80 mg	1 keer per dag	8		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ BUSCOPAN (TABL 10 MG)	PO	10 mg			# bij krampen (max 3)	...		
☐	☐	✓ DAFALGAN (TABL FORTE 1 G)	PO	1 g			# bij pijn om de 6 uur (max 3)	...		steeds 1e keuze pijnstiller, inname volgen
☐	☐	✓ DUOVENT (PUFF 200 DOS HFA)	Inhal	1 inhal			# bij kortademigheid (max 3)	...		
☐	☐	✓ ELIQUIS (TABL 2,5 MG)	PO	2,5 mg	2 keer per dag	8 20		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ ELIQUIS (TABL 5 MG)	PO	5 mg	2 keer per dag	8 20		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ IBUPROFEN EG (TABL 400 MG)	PO	400 mg			# bij pijn om de 6 uur (max 3)	...	innemen tijdens de maaltijd	= ontstekingsremmer, inname bij onvoldoende
☐	☐	✓ IBUPROFEN EG (TABL 600 MG)	PO	600 mg			# bij pijn om de 6 uur (max 3)	...	innemen tijdens de maaltijd	= ontstekingsremmer, inname bij onvoldoende
☐	☐	✓ IMODIUM (TABL INSTANT 2 MG)	PO	2 mg			# bij diarree (max 8)	...	Aanbevolen aanvangsdosering: 4 mg (= 2 tabletten), gevolgd door 2 mg (= 1 tablet) na elke losse stoelgang.	
☐	☐	✓ LIXIANA (TABL 30 MG)	PO	30 mg	1 keer per dag	8		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ LIXIANA (TABL 60 MG)	PO	60 mg	1 keer per dag	8		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ MOVICOL (ZAKJE 13,8 G)	PO	1 zakje	1 keer per dag	8		...		constipatie
☐	☐	✓ MOVICOL (ZAKJE 13,8 G)	PO	1 zakje			# bij constipatie (max 1)	...		
☐	☐	✓ MOLAXOLE (ZAKJE 13,8 G)	PO	1 zakje	1 keer per dag	8		...	= Movicol	constipatie
☐	☐	✓ MOLAXOLE (ZAKJE 13,8 G)	PO	1 zakje			# bij constipatie (max 1)	...	= Movicol	
☐	☐	✓ PARACODINE (TABL 10 MG)	PO	10 mg			# bij hoest (max 3)	...		
☐	☐	✓ PARACETAMOL EG (TABL 1 G)	PO	1 g			# bij pijn om de 4 uur (max 3)	...	= Dafalgan	= Dafalgan, steeds 1e keuze pijnstiller, inn
☐	☐	✓ PANTOPRAZOLE EG (TABL 20MG)	PO	20 mg	1 keer per dag	8		...		= maagbescherming - 20 à 30 min voor or
☐	☐	✓ PRADAXA (CAPS 110 MG)	PO	110 mg	2 keer per dag	8 20		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ PRADAXA (CAPS 150MG)	PO	150 mg	2 keer per dag	8 20		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ RIOPAN (GEL ZAKJE 10 ML)	PO	1 zakje			# bij maaglast (max 4)	...		
☐	☐	✓ TAMSULOSINE EG (CAPS RETARD 0,4 MG)	PO	0,4 mg	1 keer per dag	8		...	Ongeveer 30 minuten na de maaltijd in te nemen. Capsules ...	
☐	☐	✓ TRADONAL (TABL ODIS 50 MG)	PO	50 mg			# bij pijn om de 6 uur (max 3)	...	orodispergeerbare vorm, maximum 3 dagen in te nemen. La...	sterke pijnstiller, bij onvoldoende pijnstillin
☐	☐	✓ VOLTAREN EMULGEL (GEL FORTE 2% 100G)	LO...	1 appl			# bij spierpijn (max 2)	...		
☐	☐	✓ XARELTO (TABL 20 MG)	PO	20 mg	1 keer per dag	8		...		bloedverdunner
☐	☐	✓ XARELTO (TABL 15 MG)	PO	15 mg	1 keer per dag	8		...		bloedverdunner

Genereer thuis therapie Genereer + maak voorschrift Bewerk component (De)selecteer thuis therapie (De)selecteer ambulant voorschrift

Voorgeprogrammeerde schema's in KWS

Overzicht Hos Overzicht Hos V2 Insuline Pomp Shockbox Chemo-PTS-KS (Thuis)therapie Ambulant voorschrift Vaccinatie Medicatie balans

Vernieuw Nieuw Schema ↑EMV ↑Amb.Vs. Valideer Print Filter op einddatum na: Dat 04-02-2025 Sortering: Patiëntvriendelijke afdruk

Max. 1 GM ↔ GM 0 0 0 GM x 2 0 A 0 WM 0 0 0
GM ↔ Voeding 1 Pijnscore -1 ADR 1

Therapieschema (AZ Groeninge)

Schema: ZB calcium/vitamine D Context: KAPO / * / *

Startdatum: 04-02-2025 10:14

Naar thuis therapie	Naar ambulant voorschrift	Medicatie	Toedie...	Dosis	Frequentie	Uurs...	...	...	Nota	Indicatie
☐	☐	✓ D-VITAL (ZAKJE 500 MG-440 E)	PO	1 zakje	1 keer per dag	20	...	...	De inhoud van het zakje in een glas overbrengen, een ruime hoeveelheid water toevoegen, roeren en onmid...	vitamine D
☐	☐	✓ STEOVIT D3 (TABL KAUW 500 MG-400 E)	PO	1 tabl	1 keer per dag	20	...	...		vitamine D
☐	☐	✓ D-VITAL (ZAKJE FORT ORANG 1000 MG-880 E)	PO	1 zakje	1 keer per dag	20	...	...	De inhoud van het zakje in een glas overbrengen, een ruime hoeveelheid water toevoegen, roeren en onmid...	vitamine D
☐	☐	✓ D-VITAL (KAUWTB FRT SINAAS 1000MG/880IE)	PO	1 tabl	1 keer per dag	20	...	...		vitamine D
☐	☐	✓ VITAMINE D WILL (ZACHTE CAPS 25000 IE)	PO	25000 E	1 keer per week	10	...	...	Eerst 1 capsule per week in te nemen gedurende 4 weken, erna onderhoudstherapie met 1 capsule per ma...	vitamine D
☐	☐	✓ VITAMINE D WILL (ZACHTE CAPS 25000 IE)	PO	25000 E	1 keer per maand	10	...	...		vitamine D
☐	☐	✓ VITAMINE D WILL (ZACHTE CAPS 25000 IE)	PO	25000 E	1 keer per maand	10	...	...		vitamine D, onderhouc
☐	☐	✓ VITAMINE D WILL (ZACHTE CAPS 1000 IE)	PO	1000 E	1 keer per dag	8	...	...		vitamine D
☐	☐	✓ ACLASTA (FL 5 MG/100 ML)	IV-Inf	5 mg	1 keer per jaar	8	...	...		osteoporose
☐	☐	✓ ALENDRONATE EG (COMP 70 MG (WEKELIJS))	PO	70 mg	1 keer per week	7:30	...	...	30min voor het ontbijt in rechtopzittende houding met een groot glas water en tot 30min na inname niet gaan...	osteoporose
☐	☐	✓ EVENITY (VOORGEVULDE PEN 2X105 MG)	SC	210 mg	1 keer per 4 weken	8	...	...	Medicatie ter botversterking. Na 12 maand: vervolghtherapie met huisarts te bespreken.	
☐	☐	✓ PROLIA (SPUIT 60 MG/ML 1 ML)	SC	60 mg	2 keer per jaar	8	...	...	Medicatie ter botversterking. Nooit stoppen, levenslang.	

Voorgeprogrammeerde schema's in KWS

Therapieschema (AZ Groeninge)										
Schema		ZB Puffers								
Startdatum:		04-02-2025 10:14								
Naar thuis therapie	Naar ambulant voorschrift	Medicatie	Toedie...	Dosis	Frequentie	Uurs...	...	...	...	Nota
☐	☐	✓ AIROMIR (AUTOHALER 100 MCG/DOS 200 DOS)	Inhal	1 inhal			...	...		
☐	☐	✓ ANORO ELLIPTA 55/22 MCG (INHALATOR 30 DOS.)	Inhal	1 inhal	1 keer per dag	8		...		
☐	☐	✓ ATROVENT (PUFF 20 MCG/DOS 200 DOS)	Inhal	2 inhal			...	...		
☐	☐	✓ BRETARIS GENUAIR (INHALATOR 322 MCG/DOS 60 DOSES)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		
☐	☐	✓ BUDESONIDE (EASYHALER 200 MCG/DOS 200 DOS)	Inhal	1 inhal	1 keer per dag	8		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ BUFOMIX (INHAL 160-4.5 MCG/DOS 120 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ BUFOMIX (INHAL 320-9 MCG/DOS 60 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ DUAKLIR GENUAIR (340/12 MCG 60 DOSES)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		
☐	☐	✓ DUOVENT (PUFF 200 DOS HFA)	Inhal	1 inhal			...	...		
☐	☐	✓ ENERZAIR BREEZHALER (CAPS 114-46-136 MCG)	Inhal	1 caps	1 keer per dag	8		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLIXOTIDE (DISKUS 100 MCG/DOS 60 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLIXOTIDE (DISKUS 250 MCG/DOS 60 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLIXOTIDE (DISKUS 500 MCG/DOS 60 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLIXOTIDE (FL INHAL 50 MCG/DOS 120 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLIXOTIDE (FL INHAL 250 MCG/DOS 120 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLUTIFORM (AEROSOL 50MCG/5MCG 120 DOS)	Inhal	2 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLUTIFORM (AEROSOL 125- 5 MCG 120 DOS)	Inhal	2 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FLUTIFORM (AEROSOL 250-10 MCG 120 DOS)	Inhal	2 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ FORADIL (CAPS INHAL 12 MCG)	Inhal	12 mcg	2 keer per dag	8 20		...		
☐	☐	✓ FORMAGAL (CAPS INHAL 12 MCG)	Inhal	1 caps	1 keer per dag	8		...		
☐	☐	✓ FORMOAIR (FL INHAL 12 MCG/DOS 100 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		
☐	☐	✓ INCRUSE ELLIPTA 55 MCG (INHALATOR)	Inhal	1 inhal	1 keer per dag	8		...		
☐	☐	✓ INUVAIR NEXTHALER (FL INHAL. 100/6 MCG/DOS 120DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ INUVAIR NEXTHALER (FL INHAL. 200/6MCG/DOS 120DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ INUVAIR (FL AEROS 100-6 MCG/D 120 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ INUVAIR (FL AER 200-6 MCG/D 120 DOS)	Inhal	1 inhal	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen
☐	☐	✓ MIFLONIDE (CAPS INHAL BREEZHALER 200 MCG)	Inhal	200 mcg	2 keer per dag	8 20		...		na puffen steeds de mond spoelen met water om schimmelvorming en heesheid te voorkomen

Voorgeprogrammeerde schema's in KWS

Schema

Startdatum:

Naar thuis therapie	Naar ambulant voorschrift	Medicatie	Toedie...	Dosis	Frequentie	Uurs...	...	...	...	Nota	Indicatie
☒	☒	✓ PRADAXA (CAPS 150MG)	🍽️ PO	150 mg	2 keer per dag	8 20	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ PRADAXA (CAPS 110 MG)	🍽️ PO	110 mg	2 keer per dag	8 20	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ XARELTO (TABL 20 MG)	🍽️ PO	20 mg	1 keer per dag	8	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ XARELTO (TABL 15 MG)	🍽️ PO	15 mg	1 keer per dag	8	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ ASAFLOW (TABL 80 MG)	🍽️ PO	80 mg	1 keer per dag	8	...	...	...		bloedverdunner, in combinatie met Xarelto (preventie v atherotrombotische complicaties)
☐	☐	✓ ELIQUIS (TABL 5 MG)	🍽️ PO	5 mg	2 keer per dag	8 20	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ ELIQUIS (TABL 2,5 MG)	🍽️ PO	2.5 mg	2 keer per dag	8 20	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ LIXIANA (TABL 60 MG)	🍽️ PO	60 mg	1 keer per dag	8	...	...	...		bloedverdunner (voorkamerfibrillatie)
☐	☐	✓ PANTOPRAZOLE EG (TABL 20MG)	🍽️ PO	20 mg	1 keer per dag	8	...	...	...		= maagbescherming - 20 à 30 min voor ontbijt (zolang inname Asaflow)

Optimaal geneesmiddelengebruik: farmaflashes

Farmaflash apotheek

FLECAINIDE: APOCARD OF TAMBOCOR?

INDICATIE: anti-aritmicum bij voorkamerfibrillatie en -flutter

PROBLEEM: risico op substitutiefouten: vertraagde ↔ niet-vertraagde vrijstelling

Apocard caps.

= vertraagde vrijstelling

Capsules

Posologie steeds 1 keer per dag!



Flecainide Sandoz (Sandoz)	
harde caps. verl. afgifte Retard	
100 x 100 mg	
100 x 150 mg	
100 x 200 mg	

Flecainide EG (EG)	
harde caps. verl. afgifte Retard	
100 x 100 mg	
100 x 150 mg	
100 x 200 mg	

≠

Tambocor compr.

= GEEN vertraagde vrijstelling

Comprimés

Posologie steeds 2 keer per dag!



Flecainide Sandoz (Sandoz)	
flecainide, acetaat	
tabl. (deelb.)	
60 x 100 mg	
100 x 100 mg	

Flecainide EG (EG)	
flecainide, acetaat	
tabl. (deelb.)	
100 x 100 mg	



TIPS & TRICKS

Optimaal geneesmiddelengebruik: farmaflashes

Flecaïnide EG en Sandoz bestaan zowel in vertraagde vrijstellingsvorm als niet-vertraagde vrijstellingsvorm!

DAAROM indien voorschrift met flecaïnide:

Vraag na of het om comprimés of capsules gaat:

- a. Capsule (= steeds 1x/dag) → substitutie naar Apocard (= steeds 1x/dag)
- b. Comprimé (= steeds 2x/dag) → substitutie naar Tambocor (= steeds 2x/dag)



TIPS & TRICKS

Farmaflash apotheek maart 2016

SELOKEN® of SELOZOK®?



INDICATIE: Hoge bloeddruk, angor, hartinsufficiëntie en hartritmestoornissen

PROBLEEM: Risico op substitutiefouten bij voorschrift met generiek metoprolol

Seloken® 100 mg tabl.

≠

Selozok® 100 mg of 200 mg tabl.

= GEEN vertraagde vrijstelling

Tartraat

Tabletten met breukgleuf, pletten mag

Posologie **1 - 2 keer per dag**

= vertraagde vrijstelling

Succinaat

Tabletten met breukgleuf, NIET pletten

Posologie steeds **1 keer per dag**

® Seloken (AstraZeneca)
metoprolol, tartraat
tabl. (deelb.)
€ 100 x 100 mg
inj. oploss. i.v. [amp.]
€ 5 x 5 mg / 5 ml

® Lopresor (Daiichi Sankyo)
metoprolol, tartraat
tabl. (deelb.)
€ 100 x 100 mg
tabl. verl. afgifte (deelb.) Slow
€ 56 x 200 mg

® Metoprolol Teva (Teva)
metoprolol, tartraat
tabl. (deelb.)
€ 100 x 100 mg
metoprolol, succinaat
tabl. verl. afgifte (deelb.) Retard
€ 100 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 100 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)

® Selozok (AstraZeneca)
metoprolol, succinaat
tabl. verl. afgifte (deelb.)
€ 28 x 23,75 mg (eq. metoprolol tartraat 25 mg)
€ 28 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 28 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)

® Metoprolol EG (Eurogenerics)
metoprolol, succinaat
tabl. verl. afgifte (deelb.)
€ 28 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 56 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 98 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 28 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)
€ 56 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)
€ 98 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)

® Metoprolol Mylan (Mylan)
metoprolol, succinaat
tabl. verl. afgifte (deelb.) Retard
€ 100 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 60 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)
€ 100 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)

® Metoprolol Sandoz (Sandoz)
metoprolol, succinaat
tabl. verl. afgifte (deelb.)
€ 28 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 60 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 100 x 95 mg (eq. metoprolol tartraat 100 mg)
€ 28 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)
€ 60 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)
€ 100 x 190 mg (eq. metoprolol tartraat 200 mg)

Metoprolol Teva bestaat in een gewone en retard vorm!!!

DAAROM indien voorschrift met metoprolol:



- Vraag na om welke generiek het gaat:
 - Indien EG, Mylan of Sandoz → substitutie naar selozok
 - Indien Teva → vraag dosis na
- Dosis van metoprolol Teva:
 - Indien 95 mg of 190 mg → substitutie naar selozok
 - Indien 100 mg → substitutie naar seloken
- OF vraag de zoutvorm na:
 - Indien succinaat → substitutie naar selozok
 - Indien tartraat → substitutie naar seloken



TIPS & TRICKS

Incretinemimetica

Plaatsbepaling

- Incretinemimetica: GLP-1-analogen (Glucagon-Like Peptide-1-analogen)
- GLP-1: intestinaal hormoon dat de glycemiecontrole verzekert door
 - ✓ vertraging van de maaglediging
 - ✓ vermindering van de glucagonvrijstelling door de α -cellen (pancreas)
 - ✓ stimulatie van de glucose-afhankelijke insulinevrijstelling door de β -cellen (pancreas)
- Indicatie: Diabetes Mellitus type 2 bij volwassenen (>18j) in mono- of combinatietherapie met andere hypoglycemiserende middelen

	Stofnaam	Merknaam	Doseringen + gebruiksaanwijzingen		Toegediende dosis	Posologie
	Dulaglutide	Trulicity®	0,75 mg / 0,5 mL 1,5 mg / 0,5 mL	SC	0,75 à 1,5 mg	1 / week
	Exenatide	Bydureon®	2 mg / 0,85 mL	SC	2 mg	1 / week
	Liraglutide	Victoza®	18mg / 3mL	SC	1 week: 0,6 mg Vervolgens: 1 week: 1,2 mg Zo nodig verhoging: 1,8 mg	1 / dag
	Liraglutide + insuline degludec	Xultophy®	10,8 mg + 300 IE / 3 mL	SC	Op te titreren volgens order arts	1 / dag
	Semaglutide	Ozempic®	0,25 mg / dosis 0,50 mg / dosis 1 mg / dosis	SC	4 weken: 0,25 mg Vervolgens: 4 weken: 0,50 mg Zo nodig verhoging: 1 mg	1 / week
		Rybelsus®	3 mg tabl. 7 mg tabl. 14 mg tabl.	PO	1ste maand: 3 mg 1x/dag Vervolgens: 7 mg 1x/dag Zo nodig verhoging: 14 mg 1x/dag	1 / dag



TIPS & TRICKS

Insulines – Overzicht per klasse

Klasse	Voorbeelden	Toedientijdstip	Belangrijk	Effect na	Duur
Ultrasnelwerkend 	<u>Analoge insulines:</u> - Fiasp® - Lyumjev®	meestal 10 min vóór maaltijd	ALTIJD aanpassings schema gebruiken!	start ± 10 min	2–5 u
Snelwerkend 	<u>Analoge insulines:</u> - Apidra® - Humalog® - Novorapid® <u>Humane insulines:</u> - Actrapid® - Humuline Regular®	10-15 min vóór maaltijd		start 20–30 min (max 1–4 u)	6–9 u
Basale  	<u>Humane insulines:</u> - Humuline NPH® - Insulatard®	individueel bepaald		start 1–2 u	10–20 u
	<u>Analoge insulines:</u> - Lantus® - Toujeo® - Tresiba®	individueel bepaald		start 1,5–4 u	20–24 u (Tresiba tot 42u)
Menginsulines	<u>Humane insulines:</u> - Humuline 30/70® <u>Analoge insulines:</u> - Humalog mix 25® - Humalog mix 50® - Novomix 30®		Suspensies: 20 x omzwanken alvorens te gebruiken		

GOUDEN REGELS BIJ INSULINE



BEVRAAG ALTIJD DE **ACTUELE DOSIS**



(ULTRA)SNELWERKEND insuline: gebruik **AANPASSINGSSCHEMA**



Wat bij **nuchter blijven/onderzoek?** Aandacht voor insuline 24/7. Meer informatie: zie perioperatief glycemiebeleid (link: [perioperatief glycemiebeleid](#))



Dosis en frequentie zijn patiëntspecifiek en worden gestuurd door zelfmonitoring van bloedsuikergehalte en diabeteseducatie

HOOG-RISICO



Juiste etikettering (**HOOG-RISICO** medicatie)



Bewaring in koelkast (**2-8°C**) tot toewijzing patiënt



Nooit retour van insulineflacons of pennen!



Nooit substitutie van insulines!

Puffertool



HANDLEIDING TOT CORRECT GEBRUIK VAN INHALATOREN



Puffertool

in formularium: op voorraad

niet in formularium: mee te brengen van thuis

AIRBUFO 	AIRFLUSAL 	AIROMIR	ANORO	ATECTURA 	ATROVENT	BRETARIS
BUDESONIDE 	BUFOMIX 	DUAKLIR	DUOVENT	ENERZAIR 	FLIXOTIDE 	FLUTIFORM 
FLUTISACOMBO 	FLUTISAMIX 	FORADIL	FORMAGAL	FORMOAIR	INCRUSE	INUVAIR 
MIFLONIDE 	NOVOLIZER BUDESONIDE 	NOVOLIZER FORMOTEROL	NOVOLIZER SALBUTAMOL	ONBREZ	OXIS	QVAR 
RELVAR 	SEEBRI	SERETIDE 	SEREVENT	SPIOLTO	SPIRIVA	STRIVERDI
SYMBICORT 	TRELEGY 	TRIXEO 	TRIMBOW 	ULTIBRO	VENTOLIN	ZEPHIRUS 

Klik **HIER** voor de **FARMAFLASH**
INHALATOREN met nog meer info

 Mond spoelen met water na puffen

Puffertool

SPIRIVA Handihaler 18 µg/dosis 30 dos.

ACTIEVE STOF(FEN)	Tiotropium (=LAMA)
INDICATIE	Onderhoudsbehandeling van COPD
GEBRUIKELIJKE DOSERING VOOR VOLWASSENEN	1 inhalatie, 1 keer per dag
TYPE INHALATOR	Poederinhalatie → device type = handihaler
TE GEBRUIKEN MET VOORZETKAMER?	Neen
MOND SPOELEN NA PUFFEN?	Neen
INSTRUCTIES INHALATIETECHNIEK	→ Klik hier
FILMPJE INHALATIETECHNIEK  	Inhalatorgebruik.nl
	 



Nieuwe antidiabetica

Praktische gids voor de apotheker

Diabetestool

INLEIDING

NIEUWE ANTIDIABETICA

FARMACEUTISCHE ZORG

PATIËNTENFOLDERS

REFERENTIES

2. Nieuwe antidiabetica

Incretinomimetica

= GLP-1 analogen

= GLP-1 receptoragonisten

Tirzepatide

= GLP-1 + GIP-receptoragonist

Gliptinen

= DPP-4-inhibitoren

Gliflozinen

= SGLT2-inhibitoren

Combinatiepreparaten

A. INCRETINEMIMETICA

SOORTEN

FARMACOKINETIEK & -
DYNAMIEK

CONTRA-INDICATIES

INDICATIE

TOEDIENING &
POSOLOGIE

ZWANGERSCHAP &
BORSTVOEDING

WERKINGS-
MECHANISME

VERGETEN DOSIS

RAMADAN

RICHTLIJN

OVERDOSIS

RIJVAARDIGHEID

PLAATSBEPALING

BIJWERKINGEN

TERUGBETALING

INTERACTIES



TIPS & TRICKS

Directe orale anticoagulantia (DOAC)

Apr. J. Van Den Broucke, Apr. A. Verhaeghe, Apr. J. De Vleeschauwer, Apr. J. Vanderbeke, Apr. K. Verhelle
Gevalideerd door: Dr. G. Meeus, Dr. I. Elegeert, Dr. M. Dumolein, dr. M. Janssen, dr. K. Van Eygen, dr. M. Leys

INLEIDING

Pradaxa® (dabigatran etexilaat), Rivaroxaban sandoz (Xarelto®), Eliquis® (apixaban) en Lixiana® (edoxaban) zijn directe orale anticoagulantia (DOAC) naast de vitamine K antagonist (VKA). Deze geneesmiddelen kunnen potentieel tot levensbedreigende complicaties leiden. Ze vertonen daarenboven onderling farmacologische verschillen die in deze poster toegelicht worden.

ALGEMEEN

	PRADAXA® 75 mg - 110 mg - 150 mg compr./zakjes	RIVAROXABAN XARELTO® 2,5 mg - 10 mg - 15 mg - 20 mg compr.	ELIQUIS® 2,5 mg - 5 mg compr.	LIXIANA® 30 mg - 60 mg. (15 mg compr.)
Stofnaam	dabigatran etexilaat	rivaroxaban	apixaban	edoxaban
Werking	trombine (IIa)-inhibitor	directe Xa-inhibitor	directe Xa-inhibitor	directe Xa-inhibitor
INDICATIES				
INDICATIE 1: preventie van trombo-embolische events bij patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF) (niet bij mechanische kunstklep of ernstige mitralisklepstenose)	2 x 150 mg/dag Dosisaanpassing (*) 2 x 110 mg/dag indien: ≥ 80 jaar <u>en/of</u> gastritis, oesofagitis, GER <u>en/of</u> gelijktijdig gebruik van verapamil	1 x 20 mg/dag Dosisaanpassing (*) 1 x 15 mg/dag indien: CrCl 15-50 ml/min	2 x 5 mg/dag Dosisaanpassing (*) 2 x 2,5 mg/dag indien: CrCl 15-30 ml/min <u>en/of</u> ≥ 2 risicofactoren: SCr ≥ 1,5 mg/dl ≥ 80 jaar ≤ 60 kg	1 x 60 mg/dag Dosisaanpassing (*) 1 x 30 mg/dag indien: CrCl 15-50 ml/min <u>en/of</u> ≤ 60 kg <u>en/of</u> gelijktijdig gebruik van ciclosporine, erythromycine, ketoconazol
Opmerking: indien er sprake is van VKF in combinatie met coronair lijden gelden specifieke richtlijnen (duale of triple therapie): bespreek steeds met cardioloog	2 x 150 mg/dag Dosisaanpassing: idem als hierboven	1 x 15 mg/dag Dosisaanpassing: 1 x 10mg/dag indien: CrCl 30-49ml/min	2 x 5 mg/dag Dosisaanpassing: idem als hierboven	1 x 60 mg/dag Dosisaanpassing: idem als hierboven
INDICATIE 2: behandeling van acute veneuze trombo-embolische events (VTE): diep veneuze trombose (DVT) en longembolus (LE) Opmerking: inclusief patiënten met kanker (behalve Pradaxa®)	- Dag 1-5: therapeutisch LMWH - Vanaf dag 6: 2 x 150 mg/dag Dosisaanpassing (*) 2 x 110 mg/dag indien: ≥ 80 jaar <u>en/of</u> gastritis, oesofagitis, GER <u>en/of</u> gelijktijdig gebruik van verapamil	- 3 weken: 2 x 15 mg/dag - Daarna: 1 x 20 mg/dag Dosisaanpassing (*) Zie SKP. Eerste 3 weken steeds 2 x 15 mg. Nadien kan 1 x 15 mg indien risico op bloedingen hoger wordt ingeschat dan risico op recidief DVT/PE	- Dag 1-7: 2 x 10 mg/dag - Vanaf dag 8: 2 x 5 mg/dag Dosisaanpassing (*) Geen	- Dag 1-5: therapeutisch LMWH - Vanaf dag 6: 1 x 60mg/dag Dosisaanpassing (*) 1 x 30 mg/dag indien: CrCl 15-50 ml/min <u>en/of</u> ≤ 60 kg <u>en/of</u> gelijktijdig gebruik van ciclosporine, erythromycine, ketoconazol
Therapieduur: Minstens 3 - 6 maanden naargelang provoked/unprovoked, locatie...				
Indien secundaire preventie van recidieven aangewezen is (na ≥ 6 maand, ook na behandeling met ander anticoagulans)	2 x 150 mg/dag (zelfde dosisreductie-criteria als hierboven)	1 x 10 mg of 20 mg/dag bij respectievelijk intermediair tot hoog risico op recidief	2 x 2,5 mg/dag	1 x 60 mg/dag

Optimalisatie medicatieschema

- Juiste innamemoment van medicatie
- Correct gebruik van medicatie/therapie(on)trouw
- Indicaties

Patiënteducatie

- Folder deprescribing
- Extra informatie specifieke patiëntenpopulaties
- Therapie(on)trouw

Invullen indicaties

Medicatie

☒ gestructureerd ☐ magistraal ☐ vrij

SIFROL ▾ TABL 0,18 MG ▾ 0.18 mg ▾ + - ↑ ↓ | 🔍 AB

☐ Formularium

Toedieningsweg: 🍷 PO ▾

Uurschema: 20 ▾

Frequentie: 1 keer per dag ▾

Conditie: ▾ Max aantal per dag: 1 ▴ ▾

Indicatie: restless legs

Invullen indicaties

hospitalisatie (27-01-2024 01:43) [X]

Zoek in tekst: fluoxet [X] ☐ woord ^ v

medicatieschema bij opname

!!! Dit verslag is nog niet gevalideerd !!!

pijnstilling met paracetamol (-
Dafalgan), innemen tijdens de maaltijd.

- Pantomed, 20 mg, 1/d, 7:30u
>20-30 min voor de maaltijd.
- Pregabalin ab, 75 mg, 2/d, 8u 18u, tot 26-01-2024 00:00
- Sifrol, 0.18 mg, 1/d, 8u
- Trazodone eg, 100 mg, 1/d, 22u
>Vlak voor slapengaan.

zorgnota opgemaakt: Deze nacht zou mevrouw temesta gekregen hebben door HA van wacht. (Dosis onbekend)

Gabapentine gestopt op eigen initiatief. Neemt atacand enkel bij hoge bloeddruk (zegt dagelijks haar bd te meten).
HA niet op de hoogte van inname trazodone. Neemt sifrol 0.18mg tegen rusteloze benen 1/daags. Geen inname rivotril meer ==> THERAPIEONTROUW

Invullen indicaties

- Nieuwe opgestarte medicatie
- (langdurig) gebruik van antibiotica
- Orale cytostatica
- Off-label gebruik
- Niet-courante indicaties
- Hoog risico medicatie

Toedieningsweg: ☐ Aangegeven dosis is een totale dagdosis

Uurschema:

Frequentie:

Conditie: Max aantal per dag:

Indicatie:

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Namiddag	Avond		Opmerkingen
			08u		14u	18u	20u	
PANTOMED TABL 40 MG (Stofnaam: pantoprazol)	via de mond	dagelijks	1 tabl					INDICATIE: = maagbescherming - 20 à 30 min voor ontbijt
ASAFLW TABL 80 MG (Stofnaam: acetylsalicylzuur)	via de mond	dagelijks	1 tabl					INDICATIE: bloedverdunner (11/2021: Acuut coronair syndroom - STEMI inferior), levenslang innemen
BRILIQUE TABL 90 MG (Stofnaam: ticagrelor)	via de mond	dagelijks	1 tabl			1 tabl		in combinatie met Asaflow INDICATIE: bloedverdunner (11/2021: Acuut coronair syndroom - STEMI inferior), gedurende 1 jaar
CORDARONE TABL 200 MG (Stofnaam: amiodaron)	via de mond	dagelijks	1 tabl					
NEBIVOLOL EG TABL 5 MG (Stofnaam: nebivolol)	via de mond	dagelijks	0.5 tabl					
ROSUVASTATINE EG								

Inhoudstafel

Patiënteducatie risicopatiënten en -geneesmiddelen

Optimalisatie medicatieschema

- Juiste inname moment van medicatie
- Correct gebruik van medicatie/therapie(on)trouw
- Indicaties

Patiënteducatie

- specifieke patiëntenpopulaties

Hoogrisicoprocessen

- Urgente opnames (spoed)
- Chirurgie (preop-perop-postop)

Hoogrisicopatiënten

- >75jr
- Polypathologie/polyfarmacie
- Chronisch nierinsufficiëntie
- **Hartfalen**

Hoogrisicogeneesmiddelen

- **Bloedverdunners**
- **Pijnstillers**: NSAID/opiaten/paracetamol
- Antidiabetica
- Antibiotica
- **Psychoformaca (Deprescribing)**
-

Patiënt met
(veel)pijnmedicatie

Patiënt met gastric
bypass in
voorgeschiedenis

Patiënt met
hartfalen

Patiënt met
nierinsufficiëntie

Patiënt met
slikproblemen

Patiënt die
regelmatig valt in
combinatie met
psychofarmaca

Patiënt met
bloedverdunner(s)

Patiënt met
insuline

Patiënt met
(veel)pijnmedicatie

Patiënt met gastric
bypass in
voorgeschiedenis

Patiënt met
hartfalen

Patiënt
nierinsuf

→ **PATIENTEDUCATIE**

t in
et
ca

Patiënt met
bloedverdunner(s)

Patiënt met
insuline

Patiënt met
(veel)pijnmedicatie

→ 1^e keuze pijnstiller
→ Weinig ongewenste effecten
indien
CORRECT gebruikt



→ Aandacht voor
combinatiepreparaten en
naamsverwarring
generieken!



BCFI
BELGISCH CENTRUM VOOR
FARMACOTHERAPEUTISCHE INFORMATIE

Ik wil me abonneren

Folia Pharmacotherapeutica juni 2023

Medegedeeld door het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking

PDF-versie (uitgebreide versie) toon uitgebreide versie
PDF-versie (ingekorte versie)

Folia

Pharmacotherapeutica

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober

SELECTIE 🦋
jan. - jun.
jul. - dec.

Onbedoelde overdosering paracetamol 🦋

 Bijwerking melden of  PDF voor het melden van vermoede ongewenste effecten.

De hepatotoxiciteit van paracetamol bij **acute overdosering** is algemeen bekend. Bij volwassenen zijn problemen te verwachten vanaf een inname van 10 gram, bij kinderen vanaf 150 mg/kg. Bij bestaan van risicofactoren kan reeds toxiciteit worden gezien vanaf lagere hoeveelheden, zelfs bij **chronisch gebruik** van de gebruikelijke maximale dagdosis (4 g). Zie ook Repertorium hoofdstuk 8.2.1.

[+ meer info](#)

Hoewel het risico op paracetamolintoxicatie algemeen bekend is, blijft het aantal gemelde gevallen in België **zeer hoog**. Paracetamol staat op nummer één voor oproepen na blootstelling aan een geneesmiddel bij het **Antigifcentrum** (n= 2 208, zie jaarverslag 2021)*. Het aantal oproepen over blootstelling aan paracetamol **nam in 2021 met 17,0% toe** in vergelijking met 2020. Het Antigifcentrum vermeldt expliciet dat er in 2021 een sterk toegenomen aantal vergiftigingen was.

Een van de mogelijke oorzaken van overdosering is het **gelijktijdig gebruik van verschillende specialiteiten met paracetamol zonder dat de patiënt beseft** dat deze specialiteiten paracetamol bevatten. Het kan bijvoorbeeld gaan om twee monopreparaten met verschillende namen (merknaam en generiek). Ook zijn er veel combinatiepreparaten die paracetamol bevatten. Patiënten kennen niet altijd de samenstelling van deze combinatiepreparaten en zijn er zich dus niet van bewust dat deze paracetamol bevatten.

In België zijn er maar liefst **meer dan 40 verschillende specialiteiten** met paracetamol beschikbaar, **alleen of in combinatie (situatie op 20 juni 2023)**.

- <https://www.bcfi.be/nl/articles/4113?folia=4095>

→ Aandacht voor
combinatiepreparaten en
naamsverwarring
generieken!

Specialiteitsnamen (situatie op 20/06/23):


- Paracetamol: Algostase Mono®, Dafalgan®, Lemsip®, Pandadol®, Paracetamol, Perdolan®, Pe-Tam®, Witte Kruis Mono® (zie Repertorium)
- Paracetamol + coffeïne: Algostase®, Antigriphine®, Dafalgan Plus Caffeine®, Lonarid N®, Mann®, Panadol Plus®, Witte Kruis® (zie Repertorium)
- Paracetamol + acetylsalicylzuur + coffeïne: Excedryn®, Perdolan Compositum®, Troc® (zie Repertorium)
- Paracetamol + acetylsalicylzuur + ascorbinezuur: Afebryl® (zie Repertorium)
- Paracetamol + ibuprofen: Combogesic®, Nuralgan® (zie Repertorium)
- Paracetamol 500 mg + codeïne 30 mg: Algocod®, Dafalgan Codeine®, Paracetamol / codeine Teva® (zie Repertorium)
- Paracetamol 1 000 mg + codeïne 60 mg: Paracetamol / Codeïne Teva® (zie Repertorium)
- Paracetamol + tramadol: Algotra®, Tramadol / Paracetamol, Zaldiar® (zie Repertorium)
- Paracetamol + codeïne + coffeïne: Nevrine Codeine® (zie Repertorium)
- Paracetamol + chloorfenamine: Rhinofebryl® (zie Repertorium)
- Paracetamol + pseudo-efedrine: Parasineg®, Sinutab®, Therafixx-CapitaNasal® (zie Repertorium)

→ Aandacht voor
combinatiepreparaten
 → **PATIENTEDUCATIE!**

▼ ZALDIAR					
ZALDIAR (TABL 37,5-325 MG) 	1 tabl # bij pijn om de 6 uur, max 2 x per		03-05-2016 → ...	(Geen titel) opgelet: combinatiepreparaat van paracetamol en tramadol. indien combinatie met paracetamol (= Dafalgan): maximale dagdosis van 4g paracetamol per dag niet overschrijden aub + steeds een interval van minimum 4 à 6 uur tussen 2 innames.	combinatiepreparaat van paraceta
> TRADONAL	50 mg  # bij pijn om de 4 uur, max 4 x per		05-10-2023 → 11-10-2023 (7 dagen)	orodispergeerbare vorm, afbouw volgens pijn tot stop. maximum 7 dagen	sterke pijnstiller, bij onvoldoende
> PARACETAMOL EG	1 g • 4 keer per dag 	8 12 16 20	04-10-2023 → 02-11-2023 (30 dagen)	als laatste af te bouwen volgens pijn. daarna indien nodig bij pijn: 1 comprimé in te nemen met een interval van minimum 4 uur tussen 2 innames en een maximum van 4 comprimés per dag	= Dafalgan, 1e keuze pijnstilling.
> TRAZODONE EG	 50 mg • 1 keer per dag	23			

→ Aandacht voor
bruistabletten

→ 1 g natrium ~
2,5 g keukenzout
Risicopatiënten:
→ hypertensie
→ hartfalen
→ lithiumgebruik



Tabel. Hoeveelheid natrium per eenheid in bruispreparaten en in enkele andere geneesmiddelen (niet-exhaustieve lijst)

Bruistabletten	Na in mg/tablet	overeenkomstige hoeveelheid NaCl
Acetylcysteïne		
Acetylcysteïne EG	145 mg	370 mg
Lysomucil	157 mg	401 mg
Paracetamol		
Algostase Mono 500	316 mg	806 mg
Algostase Mono 1g	330 mg	842 mg
Dafalgan 500	412 mg	1 g
Dafalgan 1g	565 mg	1,4 g
Paracetamol EG 1g	489 mg	1,2 g
Paracetamol Sandoz 1g	469 mg	1,2 g
Acetylsalicylzuur		
Aspirine 500	250 mg	638 mg
Sedergine 325	485 mg	1,2 g
Sedergine 1g	460 mg	1,2 g
Gecombineerde pijnstillers		
Algostase	316 mg	806 mg
Algocod	316 mg	806 mg
Aspirine C	467 mg	1,2 g
Dafalgan codeïne	385 mg	982 mg
NSAID's		
Brexine	50 mg	128 mg
Brufen	197 mg	491 mg
Calcium		
D-Vital Forte	10 mg	26 mg
Steovit Forte	96 mg	245 mg
Sandoz Ca-D 600/400	52 mg	133 mg
IJzer		
Losferron	214,5 mg	547 mg
Vitamine C		
Upsa-C	284 mg	724 mg
Additiva Vitamin C	321 mg	819 mg
Varia		
Gaviscon kauwtabletten	63 mg	161 mg
Becozyme	272 mg	694 mg
Spagulax	120 mg	306 mg

* 1 mmol natrium (22,9 mg Na) komt overeen met 1 mmol NaCl (58,44 mg)

Samengevatte resultaten


In deze studie was het gebruik van natriumbevattende paracetamolpreparaten geassocieerd met een **hoger risico op cardiovasculaire events en een hogere all-cause mortaliteit** dan het gebruik van natriumvrije preparaten, en dat zowel bij patiënten met als zonder hypertensie.

Casus

Medicatie	Toed.	Dosis	Uurschema
▼ ORAAL			
> BELLOZAL	☺ PO	20 mg • 1 keer per dag	7
> CITALOPRAM EG	☺ PO	20 mg • 1 keer per dag	8
> CONTRAMAL	☺ PO	200 mg • 3 keer per dag	8 14 20
> DULOXETINE EG	☺ PO	60 mg • 1 keer per dag	8
> ETORICOXIB AB	☺ PO	30 mg • 1 keer per dag	8
> LORMETAZEPAM EG	☺ PO	2 mg • 1 keer per dag	22
> PANTOMED	☺ PO	40 mg • 1 keer per dag	7:30
> PRIMPERAN	☺ PO	5 mg • 1 keer per dag	7:40
> RIVOTRIL	☺ PO	0.5 mg • 1 keer per dag	22
▼ LOKAAL			
▼ AVAMYS			
AVAMYS (NEUSSPRAY 27,5 MCG/DOSIS 120 D)	LOC neus	1 spray • 1 keer per dag	8
▼ SYMBICORT			
SYMBICORT (TURBOHALER 4,5-160 MCG/DOS)	Inhal	1 inhal • 2 keer per dag	8 17

Casus

- Andere:
 - PIJNbehandeling: associatie basispijnstilling onder de vorm van paracetamol 3 x 1g/dag



- Aandacht voor opioïdgeïnduceerde constipatie: advies opstart Movicol 1x/dag (*underprescribing*)

Patiënt met
gastric bypass in
voorgeschiedenis

Patiënt met
hartfalen

Patiënt met
nierinsufficiëntie

Patiënteducatie: gastric bypass

Aandoening	Extra informatie
Gastric bypass	Aandachtspunten medicatie na gastric bypass: 1. Te vermijden: --> Geneesmiddelen met verhoogd risico op gastro-intestinale complicaties bv. ontstekingsremmers --> Orale anticonceptie: onbetrouwbaar na gastric bypass: graag alternatief bespreken met (huis)arts aub 2. Aan te bevelen: levenslange inname multivitamine/mineralen preparaat bv. Barinutrics®, Fitforme® + Levenslange inname calcium(citraat) en vitamine D + Jaarlijks labo onderzoek en extra aanvulling deficiënties indien nodig bv. ijzer, vitamine B12,...

Patiënteducatie: gastric bypass

PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond	# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 3 per dag) Dosis per inname: 1 tabl	Einddatum: 08-01-2025 23:59 INDICATIE: 1e keuze pijnstillers, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn
--	-------------	---	---

Neem deze medicatielijst steeds mee naar uw huisarts, uw (huis)apotheker, bij elke consultatie of opname in het ziekenhuis. Vraag een aangepaste versie bij elke wijziging en bewaar deze goed.

Extra informatie

Aandachtspunten medicatie na gastric bypass:

1. Te vermijden:

- Geneesmiddelen met verhoogd risico op gastro-intestinale complicaties bv. ontstekingsremmers
- orale anticonceptie: onbetrouwbaar na gastric bypass: graag alternatief bespreken met (huis)arts aub

2. Aan te bevelen: levenslange inname multivitamine/mineralen preparaat bv. Barinutrics®, Fitforme®

- + levenslange inname calcium(citraat) en vitamine D
- + regelmatig labo onderzoek en extra aanvulling deficiënties indien nodig bv. ijzer, vitamine B12,...



Patiënteducatie: hartfalen

Aandoening	Extra informatie
Gastric bypass	Aandachtspunten medicatie na gastric bypass: 1. Te vermijden: --> Geneesmiddelen met verhoogd risico op gastro-intestinale complicaties bv. ontstekingsremmers --> Orale anticonceptie: onbetrouwbaar na gastric bypass: graag alternatief bespreken met (huis)arts aub 2. Aan te bevelen: levenslange inname multivitamine/mineralen preparaat bv. Barinutrics®, Fitforme® + Levenslange inname calcium(citraat) en vitamine D + Jaarlijks labo onderzoek en extra aanvulling deficiënties indien nodig bv. ijzer, vitamine B12,...
Hartfalen	Gebruik van ontstekingsremmers en bruistabletten wordt afgeraden ikv hartfalen.

Patiënteducatie: hartfalen

- Medicatieschema bij ontslag:

PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond	# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 3 per dag) Dosis per inname: 1 tabl	Einddatum: 08-01-2025 23:59 INDICATIE: 1e keuze pijnstillers, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn
---	-------------	---	---

Neem deze medicatielijst steeds mee naar uw huisarts, uw (huis)apotheker, bij elke consultatie of opname in het ziekenhuis. Vraag een aangepaste versie bij elke wijziging en bewaar deze goed.

Extra informatie

gebruik van ontstekingsremmers en bruistabletten wordt afgeraden ikv hartfalen.



Extra informatie in het medicatieschema

Aandoening	Extra informatie
Gastric bypass	Aandachtspunten medicatie na gastric bypass: 1. Te vermijden: --> Geneesmiddelen met verhoogd risico op gastro-intestinale complicaties bv. ontstekingsremmers --> Orale anticonceptie: onbetrouwbaar na gastric bypass: graag alternatief bespreken met (huis)arts aub 2. Aan te bevelen: levenslange inname multivitamine/mineralen preparaat bv. Barinutrics®, Fitforme® + Levenslange inname calcium(citraat) en vitamine D + Jaarlijks labo onderzoek en extra aanvulling deficiënties indien nodig bv. ijzer, vitamine B12,...
Hartfalen	Gebruik van ontstekingsremmers en bruistabletten wordt afgeraden ikv hartfalen.
Nierinsufficiëntie	Gebruik van ontstekingsremmers wordt afgeraden ikv verminderde nierfunctie.

Contra-indicatie NSAID patiëntendossier



The screenshot shows a patient dossier interface with a red box highlighting the 'Contra-indicatie ontstekingsremmer/NSAID' entry. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Overzicht Hos', 'Overzicht Hos V2', 'Insuline Pomp', 'Shockbox', 'Chemo-PTS-KS', and '(Thuis)therapie'. Below the navigation bar is a toolbar with icons for 'Voorschrift', 'Schema', 'Verlengen', and 'Valideer'. A dropdown menu is set to '24 uur [uren]' and a date/time field shows '13-11-2023 07:00'. The main content area displays a table with columns for 'Medicatie' and 'Toed.' (Toedieningswijze) and rows for hours of the day (07 to 05). The 'Contra-indicatie ontstekingsremmer/NSAID' entry is highlighted in red.

Medicatie	Toed.	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05
+ Contra-indicatie ontstekingsremmer/NSAID																								

Patiënt met
slikproblemen

Patiënt met slikproblemen

STAP 1: (niet geplette) medicatie innemen met Gloup slikgel

STAP 2: geplette medicatie innemen met Gloup slikgel (www.pletmedicatie.be)

Overzicht Hos | Overzicht Hos V2 | Insuline Pomp | Shockbox | Chemo-PTS-KS | (Thuis)therapie | Ambulant voorschrift | Vaccinatie | Medicatie balans

Vernieuw | Nieuw | Schema | ↑EMV ↑Amb.Vs. | Valideer | Print | Filter op einddatum na: Dat 04-02-2025 | Sortering: Patiëntvriendelijke afdruk

Max. 1 | GM ↔ GM 0 0 0 | GM x 2 0 | A 0 | WM 0 0 | GM ↔ Voeding 1 | Pijnscore -1 | ADR 1

Medicatie	Toed.	Dosis	Uur...	Opm.	Indicatie	Actieve stof
D-CURE (DRINKBARE AMP 25.000 E/ML)	PO	25000 E • 1 keer per 4 weken	8		04 onderhoudsdosis vitamine D, 1 keer per maand!	colecalfiferol

Therapieschema (AZ Groeninge)

Schema: ZB Gloup

Startdatum: 04-02-2025 10:33

Context: KNEF / 30111 / *

Naar thuis therapie	Naar ambulant voorschrift	Medicatie	Toedieni...	Dosis	...	Conditie	Begindatum	...	Nota
☒	☐	GLOUP SLIKGEL (FL ZERO FRAMBOOS 150ML)	PO	1 d...		# bij inname medicatie (max 10)	04-02-2025 10:33		1.Plaats de medicatie op een lepel 2.Spuit een kleine hoeveelheid Gloup over de medicatie 3.Neem dit in zijn geheel in Gloup kan gebruikt worden voor zowel gehele als geplette medicatie. Check altijd bij je apotheker of je medica

Patiënt met slikproblemen



Naam: KWS-TESTPATIENT AZGK NUMMER 331
 Geboortedatum: 01-06-2022
 EADNr: 331
 Geldig vanaf 05-02-2025

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond	Opmerkingen
			08u			
D-CURE DRINKBARE AMP 25.000 E/ML (Stofnaam: colecalciferol)	via de mond	1 keer per 4 weken	1 amp			INDICATIE: onderhoudsdosis vitamine D, 1 keer per maand!
PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 4 per dag) Dosis per inname: 1 tabl			Begindatum: 04-02-2025 INDICATIE: 1e keuze pijnstillers, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn
GLOUP SLIKGEL FL ZERO FRAMBOOS 150ML	via de mond		# bij inname medicatie (max aantal: 10 per dag) Dosis per inname: 1 dosis			Begindatum: 04-02-2025 1. Plaats de medicatie op een lepel 2. Spuit een kleine hoeveelheid Gloup over de medicatie 3. Neem dit in zijn geheel in Gloup kan gebruikt worden voor zowel gehele als geplette medicatie. Check altijd bij je apotheker of je medicatie kan geplet worden. INDICATIE: Vergemakkelijkt de inname van medicatie bij slikproblematiek en maskeert de smaak

Patiënt met slikproblemen

Medicatie	Toediening	Frequentie	Ochtend	Middag	Avond	Opmerkingen
			08u			
ASAFLOW TABL 80 MG (Stofnaam: acetylsalicylzuur)	via de mond	dagelijks	1 tabl			NIET PLETBAAR. indien nodig: voorstel alternatief: Aspegic zakje 100 mg. Navraag huisarts aub. INDICATIE: bloedverdunner (perifeer vaatlijden)
PARACETAMOL EG TABL 1 G (Stofnaam: paracetamol)	via de mond		# bij pijn om de 4 uur (max aantal: 4 per dag) Dosis per inname: 1 tabl			Begindatum: 04-02-2025 pletbaar. INDICATIE: 1e keuze pijnstiller, steeds als laatste af te bouwen volgens pijn




- www.valpreventie.be



U gebruikt een geneesmiddel om beter te kunnen slapen of om te kalmeren (een benzodiazepine of een aanverwant product).

- Ontdek wat deze geneesmiddelen doen.
- Langdurig gebruik ervan is niet zonder risico.




Patiënt met bloedverdunner(s)


→ indicatie?

→ > 1 bloedverdunner?

→ Aandacht voor maagbescherming bij
patiënten > 70 jaar

→ Reden van opname gerelateerd aan
(correct/verkeerd) gebruik bloedverdunner?





Indicatie 1: Voorkamerfibrillatie (VKF)

Indicatie 2: Preventie/behandeling diep veneuze trombose of longembolen

Opmerking: preventie na THP/TKP: Asaflow® 80 mg 2x/dag 28 dagen

afkortingen

BMS: bare-metal stent
CABG: coronaire bypass
DAPT: duale antiplaatjes therapie
DES: drug eluting stent
DOAC: Directe Orale Anticoagulantia
iCVA: ischemisch cerebrovasculair accident
LMWH: low molecular weight heparins
m: maand
MI: myocard infarct
PCI: percutane coronaire interventie
TIA: transient ischemic attack
THP/TKP: totale heup/knie prothese
VKA: Vitamine K antagonisten
VKF: voorkamerfibrillatie

Perioperatief beleid:
raadpleeg: [https://
www.e17bridginglinkbloedve
rdunners.be/](https://www.e17bridginglinkbloedverdunners.be/)



Triple therapie (combinatie anticoagulantia en anti-aggregantia)
steeds zo kort mogelijk (conform guidelines)

Indicatie CARDIO: Secundaire preventie **coronair arterieel vaatlijden (CAD):**

1) **DAPT:** meestal Asaflow® + Efient® of Ticagrelor (Brilique®), alternatief Asaflow® + Clopidogrel

- **stabiel coronair lijden + PCI (+BMS/DES stent): 6m DAPT** (high bleeding risk: 3m)

Ter info: stabiel coronair lijden conservatieve behandeling of + CABG (bypass): Asaflow® of clopidogrel monotherapie

- **ACS (acuut MI) + PCI (+BMS/DES) of CABG of conservatieve behandeling:**

12m DAPT (high bleeding risk: 6m)

2) **Na DAPT:** in **alle indicaties:** **levenslang monotherapie Asaflow®**

(alternatief: Clopidogrel of, Asaflow® + Xarelto® 2,5 mg 2x/dag (terugbetalingscriteria!))

Indicatie NEURO: Secundaire preventie **iCVA/TIA (hoog risico):**

21 d DAPT, daarna **levenslang monotherapie Clopidogrel** (alternatief: Asaflow®)

Uitz.1: VKF: behandeling met orale anticoagulantia

Uitz. 2: CVA onder clopidogrel: resistentietest: indien geen resistentie: **DAPT ad vitam**

Indicatie VASCULAIRE HEELKUNDE: Secundaire preventie symptomatisch

perifeer arterieel vaatlijden (PAV):

1) **levenslang monotherapie Asaflow®**

NOOT: + Xarelto® 2,5 mg 2x/dag (terugbetalingscriteria!)

2) **postchirurgisch** met drug eluting stent of ballon: **1m tot 3 m DAPT**, daarna verder volgens punt 1)

NOOT: indien VKF (DOAC/VKA): 1m tot 3 m + Asaflow®, daarna terug zoals voorheen


Fraxodi® vs Fraxiparine®

Vergelijking van de anti-Xa activiteit tussen Fraxiparine®/ Fraxodi® en andere beschikbare LMGHs in België
(tabel opgesteld op basis van de wetenschappelijke bijsluiters van : Fraxiparine®, Fraxodi®, Clexane®, Innohep®, Fragmin®)

Anti-Xa IU (Ph. Eur.)	Fraxiparine® (nadroparine)	Clexane® (enoxaparine)	Innohep® (tinzaparine)	Fragmin® (dalteparine)
2000		20 mg		
2500-3000	0,3 ml		2500 IU	2500 IU
3500-4000	0,4 ml	40 mg	3500 IU	
4500-5000			4500 IU	5000 IU
5500-6000	0,6 ml	60 mg		
6500-7000				
7500-8000	0,8 ml	80 mg		7500 IU
8500-9000				
9500-10000	1,0 ml	100 mg	10000 IU	10000 IU

Anti Xa IU (Ph. Eur.)	Fraxodi® (nadroparine)	Clexane® (enoxaparine)	Innohep® (tinzaparine)	Fragmin® (dalteparine)
10000-11000		100 mg	10000 IU	10000 IU
11000-12000	0,6 ml	120 mg		
12500-13000				12500 IU
13500-14000			14000 IU	
14500-15000		150 mg		15000 IU
15500-16000	0,8 ml			
17500-18000			18000 IU	18000 IU
18500-19000	1,0 ml			

NSAID: aandacht voor maagbescherming



CASUS

81j

♂

NL

KS

30027-KCAR (2673^1)

Medicatie

dek de mogelijkheden van het nieuw patiëntdossier.

Zoek naar een pagina

Overzicht Hos

Overzicht Hos V2

Insuline Pomp

Shockbox

Chemo-PTS-KS

(Thuis)therapie

Ambulant voorsch

Vernieuw

Nieuw

Schema

†EMV

†Amb.Vs.

Valideer

Print

Filter op einddatum na: Dat 14-11-2023

Sortering: Klasse GM, per naam geneesmiddel

Favorieten

EMV thuis

EMV HOS

OpvolgNota's

Dashboard

ECG

Probleemlijst

Medicatie	Toed.	Dosis	Uurschema	Tijdspanne	Opn.
> ASAFLW	PO	80 mg • 1 keer per dag	8	13-11-2023 → ...	bloedverdunner
> XARELTO	PO	2.5 mg • 2 keer per dag	8 18	13-11-2023 → ...	bloedverdunner
COVERAM (PERIND-AML)					
COVERAM (PERIND-AML) (TABL 10-10 MG)	PO	1 tabl • 1 keer per dag	8	... → ...	
> ATORVASTATIN APOTEX	PO	80 mg • 1 keer per dag	20		

Datum	Afdeling	Tekst	Contact type	Zender
14-11-2023 15:44	KCAR	advies apotheek ikv spoedopname: asaflow + xarelto + 81 jaar: verhoogd risico op (gastro-intestinale) bloedingen. --> opstart maagprotectie bv. Pantomed 20 mg aanbevolen (cfr. START-criteria)	hospitalisatie	Julie Van Den Broucke

Casus: (langdurig) gebruik van ≥ 1 bloedverdunner

type Intermediair verslag ☐ Niet via

probleemstelling
medicatieschema bij opname + analyse thuismedicatie

bevindingen
Kortrijk, 07-12-2023
Klinische farmacie: medicatieschema bij opname + analyse thuismedicatie

duale antiplaatjes therapie gedurende 3mnd opgestart in mei, neemt nog steeds beide.

Analyse thuismedicatie

Dit is een farmaceutisch advies ter ondersteuning van het medisch handelen. De behandelen geneesmiddelen therapie bij de patiënt.

Thuismedicatie

- Asaflow, 80 mg, 1/d, 8u
INDICATIE: bloedverdunner (secundaire preventie, iCVA 2011)

- Befact forte (tabl nf), 1 tabl, 1/d, 8u

- Clopidogrel eg, 75 mg, 1/d, 8u
> bloedverdunner

- Elosit 0.4 mg 1/d 8u

Indicatie NEURO: Secundaire preventie iCVA/TIA (hoog risico):
21 d DAPT, daarna levenslang monotherapie Clopidogrel (alternatief: Asaflow®)
Uitz. VKF: behandeling met orale anticoagulantia

Casus: (langdurig) gebruik van ≥ 1 bloedverdunner

Analyse thuismedicatie

Dit is een farmaceutisch advies ter ondersteuning van het medisch handelen. De behandelende arts blijft de eindverantwoordelijke voor de geneesmiddelen therapie bij de patiënt.

1) DAPT asaflow + clopidogrel: secundaire preventie iCVA + PTA 5/2023
 --> voorziene duur van DAPT = 3 maand! (maw tem 8/2023) - mevrouw neemt dit nog steeds
 --> graag herevaluatie aub; secundaire preventie iCVA = levenslang clopidogrel

Aangepast medicatieschema door de apotheker:

TABL NR					
CLOPIDOGREL EG TABL 75 MG (Stofnaam: clopidogrel)	via de mond	dagelijks	1 tabl		INDICATIE: bloedverdunner (secundaire preventie iCVA, levenslang in te nemen)
ASAFLW TABL 80 MG (Stofnaam: acetylsalicylzuur)	via de mond	dagelijks	1 tabl		voorzien tot 17/8/2023, erna stop; te bespreken met (huis)arts aub INDICATIE: bloedverdunner (secundaire preventie, iCVA 2011 en PTA)
ESL AVIT					

Casus: (langdurig) gebruik van ≥ 1 bloedverdunner

→ DAPT (Duale Anti Plaatjes Therapie)

→ (altijd) beperkt in tijd!



Casus: reden van opname bloeding/trombose bij patiënt met bloedverdunner

30112 25-09-2023 13:33

Medicatie	Toed.	Dosis	Uurschema	Tijdspanne	Opm.	Laatste wijziging	Ind	Validatie door
> PANTOMED	PO	20 mg • 1 keer per dag	7:30	24-09-2023 → ...	20-30min voor de maaltijd	25-09-2023 • apotheek		
> D-CURE	PO	25000 E • 2 keer per maand	12	06-05-2020 → ...	1e en 15e van de maand	06-05-2020 • supervisor		
> CALCIUMCARBONAAT	PO	1 g • 1 keer per dag	18			06-05-2020 • supervisor		
> ASAFLOW	PO	80 mg • 1 keer per dag	8	24-09-2023 → ...	bloedverdunner	25-09-2023 • apotheek		
> FOLAVIT	PO	4 mg • 1 keer per week	18	06-05-2020 → ...	Op Maandag	06-05-2020 • hoofdverpleging		
> ROSUVASTATINE EG	PO	10 mg • 1 keer per dag	20	24-09-2023 → ...		25-09-2023 • apotheek		
> AMOXICLAV SANDOZ	PO	875 mg • 3 keer per dag	8 14 20	24-09-2023 → ...		25-09-2023 • apotheek		
> ALGOSTASE MONO	PO	1 g • 3 keer per dag	8 14 20		1ste keuze pijnstiller	25-09-2023 • apotheek		

Vitalink: -

E-Health box: +

Anamnese

Reden van opname: Rechter parese arm, hematoom.

Cave:

04-08-2003: Ingreep - EVAR: Endovasculair Aneurysma Repair 04/08/2003

26-10-2016: Allergie - Geen gekende allergieën

16-11-2017: Communicatieprobleem Zicht

20-03-2019: Communicatieprobleem Gehoor

Comorbiditeit:

- 1999: cholecystectomie op cholecystitis

- 2013: AAA waarvoor endoprothese (Dr. Wallaert).

- 2009: LIMA geïsoleerd naar LAD (geen jump naar diagonaal OLV Aalst).




Veiligheidscampagne insulines


1. BEVRAAG ALTIJD DE ACTUELE DOSIS
2. SNELWERKEND insuline: gebruik
AANPASSINGSSCHEMA
3. Wat bij nuchter blijven/onderzoek?
Aandacht voor insuline 24/7
4. Wijziging insulinedrip: actrapid flacons:
zie procedure!



LET OP!



**CORRECT
INSULINEBELEID**



Inhoudstafel



Take home messages

Take home messages

Actualisatie en
optimalisatie van het
medicatieschema
(= toedieningstijdstip,
pletmedicatie,
deelbaarheid,
therapietrouw, ...)

Take home messages

Actualisatie en
optimalisatie van het
medicatieschema
(= toedieningstijdstip,
pletmedicatie,
deelbaarheid,
therapietrouw, ...)

Aandacht voor correcte
dosis en posologie
risicoGM,
complexvorming, ...
= identificatie en
signalisatie



Take home messages

Actualisatie en
optimalisatie van het
medicatieschema
(= toedieningstijdstip,
pletmedicatie,
deelbaarheid,
therapietrouw, ...)

Aandacht voor correcte
dosis en posologie
risicoGM,
complexvorming, ...
= identificatie en
signalisatie

Patiënteducatie
risicopopulaties
= interventie en
preventie

**"If you want to go fast go
alone. If you want to go far,
go together."**

- African proverb



